Bruksrettledning
Tillaging: Kopperkalk Bayer røres først ut med litt vann til en tykk velling i et mindre kar. Fyll sprøyten ca. 2/3 med ønsket vannmengde, tilsett oppmålt preparat under omrøring og fyll etter med vann til ønsket væskemengde. Sørg for god omrøring under arbeidet. Påse at omrøringen er i gang også ved eventuelle arbeidspauser.
Bruk ikke sterkere konsentrasjon enn 5 x normal styrke ved tåkesprøyting.

Unngå bruk av metallbeholdere, da kopperoksyklorid kan virke korroderende på disse.

Væskemengde: Bruk en væskemengde som sørger for at alle plantedeler dekkes med sprøytevæske.

Sprøyt ikke ved høy temperatur, i sterkt solskinn eller på regn- eller duggvåte planter (ømfintlige kulturer).

Frukt:
Sprøyteteknikk: Dose er oppgitt i konsentrasjon pr. 100 liter vann. Væskemengde er oppgitt pr. 100 meter rad eventuelt med en normal plantehøyde (oppgitt i parentes) og med moderat dråpestørrelse i sprøytedusjen. Ved avvik fra oppgitt normal plantehøyde, endres dose- og væskemengde tilsvarende.

Normalvæskemengde: I tettplantinger/"slank spindel" av eple brukes fra blomstring 75 liter pr. 100 m rad (kjøring mellom radene). Før blomstring og i nyplantinger reduseres væskemengden.
I større trær av eple, pære og steinfrukt (2,5 - 3 m trehøyde og 2 – 2,5 m kronediameter) brukes 100 liter pr. 100 m rad.
Før blomsting reduseres væskemengden.

Frukttrær, allment:
Mot rothalsråte ("tredød") vaskespøytes 1 - 2 ganger ved stammebasis ved fare for sårinfeksjon, f. eks. etter slått og jordbearbeiding. Unngå drift opp i treet.
Dose: 500 g pr. 100 liter vann.
Mot mose, lav m. v. sprøytes etter bladfall og tidlig om våren før "grønn spiss".
Dose: 500 – 750 g pr. 100 liter vann.

7 038090 900880

Kjernefrukt (eple og pære):
Mot frukttrekreft og skurv sprøytes før "tett klynge".
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.
Mot frukttrekreft Sprøytes ved begynnende bladfall.
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.
Gjenta behandlingen etter bladfall.
Dose: 500 g pr. 100 liter vann.
Mot greinskurv på pære sprøytes før "tett klynge" .
Dose: 500 g pr. 100 liter vann.

Plomme:
Mot plommepung, grå monilia og haglskuddsyke sprøytes før "tett klynge" og på "ballongstadiet".
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.

Kirsebær:
Mot haglskuddsyke forårsaket av sopp sprøytes like før "tett klynge" og like etter blomstring.
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.
Mot haglskuddsyke forårsaket av steinfruktbakteriose sprøytes like før og like etter blomstring.
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.
Ved eventuell sprøyting ved bladfall om høsten.
Dose: 500 g pr. 100 liter vann.

Bærbusker:
Normalvæskemengde: 45 – 50 liter pr. 100 rad.
Dose: 250 g (375 ml) pr. 100 liter vann.

Bringebær:
Mot flekkskrurv, skuddsyke og greinbrann sprøytes når de nye skuddene er 10-15 cm lange. Gjenta behandlingen når de er 20-25 cm.
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.

Rips, solbær og stikkelsbær:
Mot bladfall- og bladflekksopper sprøytes etter høsting.
Dose: 500 g pr. 100 liter vann.

Hageblåbær:
Mot greindød sprøytes ved knoppsprett.
Gjenta om nødvendig behandlingen 1 - 2 ganger ved bladfall.
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.

Grønnsaker:
Normalvæskemengde: 100 liter pr. dekar.
Kopperkalk Bayer kan hemme planteveksten, og bør brukes mot slutten av sesongen.

Selleri, persille og gulrot:
Mot bladflekksopper.
Sprøyt ved fare for eller ved begynnende angrep.
Dose: 500 g pr. dekar.

Bete:
Mot beteringflekk sprøytes ved fare for eller ved begynnende angrep.
Dose: 500 g pr. dekar.

Korsblomstrede kulturer
(kålvekster, rotgrønnsaker, rotvekster):
Mot kålbladskimmel og skulpesopp sprøytes ved fare for eller ved begynnende angrep.
Dose: 500 g pr. dekar.

Ert, løk og spinat:
Mot bladskimmel sprøytes ved fare for eller ved begynnende angrep.
Dose: 500 g pr. dekar.

Løk og purre:
Mot papirflekk sprøytes ved fare for eller ved begynnende angrep.
Dose: 500 g pr. dekar.

Tomat:
Mot potettørråte sprøytes ved fare for eller ved begynnende angrep.
Dose: 500 g pr. dekar.

Potet:
Mot potettørråte sprøytes når været er rått eller når angrep varsles. Laveste mengde nyttes ved første sprøyting når riset er 30-50 cm høyt.
På grunn av fare for sviskade på riset bør preparatet helst brukes mot slutten av veksttiden.
Dose: 400 - 600 g pr. dekar.
Normalvæskemengde: 40 - 50 liter pr. dekar.

Korn:
Ved koppermangel (gulspiss-syke). Bladgjødsling i veksttiden før skyting.
Dose: 125 g pr. dekar.
Normalvæskemengde: 25 liter pr. dekar.

Prydvekster:
Treaktige prydvekster:
Mot skurv sprøytes ved begynnende angrep.
Dose: 250 g pr. 100 liter vann.

Urteaktige prydvekster:
Mot bladskimmel- og bladflekksykdommer sprøytes ved begynnende angrep.
Dose: 500 g pr. 100 liter vann.

Blandbarhet
Erfaringer har vist at Kopperkalk Bayer under normale sprøyteforhold kan blandes med Bayleton® Spesial, Croneton®, Gusathion®, Lebaycid®, eller Thiovit®.
Blandingen bør sprøytes ut straks.
Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre i virkning, men kan også føre til effekter som ikke er påvist i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukers eget ansvar.

Kopperkalk Bayer

Kopperoksyklorid vanndispergerbart pulver mot soppsykdommer i frukttrær, bærbusker, grønnsaker, potet og prydvekster, mot mose og lav på frukttrær, bærbusker og treaktige prydvekster samt ved koppermangel (gulspiss-syke) i korn.

Sammensetning:
Kopperoksyklorid ..... 840 g/kg
Sprede-, klebe- og fyllstoffer ..... 160 g/kg

ADVARSEL
Farlig ved innånding og svelging.
OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN
EKSTREMT GIFTIG FOR VANNLEVENDE ORGANISMER - må ikke nyttes nærmere åpent vann enn 10 meter.
Bruk egnet verneutstyr (Se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

HELSESKADELIG

Avgiftsklasse: 4
Behandlingsfrist: 4 dager

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Novartis Ltd., Brasil

REG.NR. 2000.101

Netto 25 kg

Det er forbudt å bruke Kopperkalk Bayer i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

Bruksområde
Kopperkalk Bayer er tillatt brukt i kjernefrukt (eple og pære), steinfrukt (moreller, plommer, sur- og søtkirsebær), bærbusker (bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær), belgvekster, kålvekster, løkvekster, rotgrønnsaker og rotvekster, potet, spinat, tomat, prydvekster samt høst- og vårkorn.

Virkemåte
Kopperkalk Bayer har forebyggende virkning og hindrer soppen i å trenge inn og etablere seg. Kopperkalk Bayer er et kontakt-middel, og ved gjentatte sprøytinger er det viktig å dekke den nye tilveksten med sprøytevæske

Virkeområde
Kopperkalk Bayer virker mot bladfall-, bladflekk- og bladskimmelsykdommer, frukttrekreft, grå monilia, haglskuddsyke, potettørråte, plommepung, skurv, m. v., mose og lav samt som bladgjødsel ved koppermangel (gulspiss-syke).

Forsiktighetsregler
Bruk egnede vernehansker (f. eks. polykloropren) ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, bør halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L eller A1/P3 brukes.
Skift og vask tøyet når sprøytearbeidet er avsluttet.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjons-sentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).
Unngå å gå inn i område eller håndtere behandlede plantedeler etc. uten tilstrekkelig verneutstyr som beskytter hud og øyne de første 24 timer etter behandling.

Rengjøring
Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes ca. 5 ganger med vann, og sprøytes ut i h. h. t. bruksrettledningen.
Rengjør måle-, sprøyte- og verneutstyr etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Avfallshåndtering
Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.
Konsentrerte plantevernrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring
Lagres tørt og kjølig.

Merk
Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette er ingen garanti for at produktet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis produktet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.