

# Goltix®



# Goltix®

# Goltix®

Vanndispergerbart granulat

# Goltix®

## Mot frøugras i jordbær

### Sammensetning:

Metamitron .....	700 g/kg
Fyllstoffer .....	300 g/kg

### ADVARSEL

**Farlig ved svelging**  
**Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn**  
**Meget giftig for vannlevende organismer**  
**– må ikke nyttes nærmere åpent vann enn 5 meter**



HELSESKADELIG

**Bruk egnet verneutstyr**  
**(se forsiktighetsreglene)**  
**Uskadeliggjør tomemballasjen**  
**(se avfallshåndtering)**

Avgiftsklasse: 3

**Behandlingsfrist:** Jordbær må sprøytes senest før blomstring.

REG.NR. 2000.142  
 Netto: 1 kg

Importør: Bayer AS  
 Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

**Bayer**

**Det er forbudt å bruke Goltix i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.**

### Bruksområde

Goltix er tillatt brukt i jordbær.

### Virkeområde

Goltix har avhengig av sprøytetidspunkt, sprøyteforhold og dose god virkning mot ettårige ugrasarter som balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsesgras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarv, veronika, åkergråurt og åkerstemorsblom.

Virkingen er svak mot klengemaure og vindeslierekne, samt tungras etter at disse har spirt.

### Virkemåte

Goltix hindrer nytt ugras i å spire fram og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold på ugrasets frøbladstadium og fram mot ugraset har 1 – 2 varige blad. Sprøyt om morgenen. Virkingen er svak mot frøugras med mer enn 3 varige blad. Da anbefales om mulig en jordbearbeiding eller et svimiddel før sprøyting.

Best spirehemmende virkning fås ved å sprøyte på fuktig jord.

### Bruksrettleiding

Goltix er et vanndispergerbart granulat med stabil volumvekt. 100 g tilsvarer ca. 150 ml.

Tillaging: Fyll sprøyten ca. 2/3 med ønsket vannmengde, tilsett oppmålt preparat under omrøring og fyll etter med vann til ønsket væskemengde. Påse at omrøringen er i gang også ved eventuelle arbeidspauser.

### Nyplantede felt

Årlig maksimal dose er 400 g (600 ml) pr. dekar for robuste sorter som 'Bounty', 'Glima' og 'Senga Sengana'. I mer ømfintlige sorter som 'Jonsok', 'Korona' og 'Zephyr' samt nye og uprøvede sorter, bør maksimal årlig dose ikke overstige 250 g (375 ml) pr. dekar. Maksimal årlig dose deles på minst 2 behandlinger, og bruk ikke mer enn halvparten av maksimal dose pr. sprøyting. Sprøyt første gang når jordbærplantene har rotfestet seg og senest når ugraset har 1 – 2 varige blad. Gjenta ved behov behandlingen etter 2 – 3 uker.

### Etablerte felt

I etablerte felt er årlig maksimal dose 500 g (750 ml) pr. dekar for robuste sorter som 'Bounty', 'Glima' og 'Senga Sengana'. I mer ømfintlige sorter som 'Jonsok', 'Korona' og 'Zephyr' samt nye og uprøvede sorter, bør maksimal årlig dose ikke overstige 350 g (525 ml) pr. dekar. Maksimal årlig dose bør deles på minst 2 behandlinger, og bruk ikke mer enn halvparten av maksimal dose pr. sprøyting. Sprøyt første gang når ugraset har 1 – 2 varige blad om våren og resten etter avhøsting.

### Jordart:

På sandjord med lavere moldinnhold enn klasse 3 (se jordanalyse), økes risiko for skader på kulturplantene p. g. a. stort rottopptak. Dose pr. behandling bør derfor ikke overstige 150 g (225 ml) i nyplantede felt og 200 g (300 ml) pr. dekar i etablerte felt for robuste sorter. I ømfintlige sorter bør dose pr. behandling ikke overstige 75 g (113 ml) i nyplantede felt og 100 g (200 ml) pr. dekar i etablerte felt.

### Vanning:

Kraftig regnvær eller vanning de første 14 dagene etter behandling øker risikoen for ned- og utvasking. Vanning som i praksis gir netto overskudd i vannbalansen, må unngås på lette, humusfattige jordarter. Dette kan føre til ned- og utvasking.

### Blandbarhet

Erfaringer har vist at Goltix under normale sprøyteforhold kan blandes med Betanal®, uten å skade i de vanligste sortene.

Blandingen må sprøytes ut under omrøring straks etter tillaging.

Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre i virkning, men kan også føre til effekter som ikke er påvist i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukers eget ansvar.

1) = registrert varemerke for Aventis Crop Science.



7 038090 505320