

# Amistar Pro



## Suspensjonskonsentrat av azoksystrobin og fenpropimorf

Mot soppsykdommer i korn.

Sammensetning: Azoksystrobin ..... 100 g/l  
Fenpropimorf ..... 280 g/l  
Fyllstoffer ..... 639 g/l

### ADVARSEL



IRRITERENDE

Irriterer huden

Kan gi allergi ved hudkontakt

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

Unngå hudkontakt

Meget giftig for vannlevende organismer. Må ikke nyttes nærmere vannførende grøfter, bekker, samt dammer og større vannforekomster enn 5 meter.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist: 6 uker

Reg.nr. 2000.145.

Avgiftsklasse 2

Produksjonsår: 2000

**NB! Rystes før bruk!**

Tilvirker:

**ZENECA Agrochemicals, England**

Fernhurst, Haslemere. Surrey GU27 3JE, ENGLAND

Importør:

**ZENECA Agro Scandinavia**

Postboks 150 Bryn, N-0611 Oslo. Tlf. +45 32 88 81 00

® Registrert varemerke: Amistar, Zeneca Agrochemicals

**Nettoinnhold: 5 liter e**

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjendt bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## **BRUKSOMRÅDE**

AMISTAR®PRO er tillatt brukt mot sopp sykdommer i korn.

## **BEHANDLINGSFRIST**

Må ikke brukes senere enn 6 uker før høsting.

## **VIRKEOMRÅDE/VIRKEMÅTE**

Amistar Pro er et soppmiddel med virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, hveteaksprikk (*septoria nodorum*), hvetebbladprikk (*septoria tritici*), rust og svertesopper. Amistar Pro inneholder to virksomme stoffer, azoksystrobin og fenpropimorf, som virker forskjellig på soppens livsprosesser. Fenpropimorf-komponenten øker effekten mot meldugg og grå øyeflekk. Amistar Pro transporteres systemisk i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Amistar Pro bekjemper soppen mest effektivt før soppen har etablert seg på planten. Det bør derfor sprøytes ved begynnende angrep eller når angrep forventes. På visse sopp sykdommer virker Amistar Pro også kurativt f.eks. meldugg, rust og byggbrunflekk. Amistar Pro fører til at planten holder seg lengere grønn, men i forsøkene har bruk av Amistar Pro ikke forsinket kornets modning.

Amistar Pro er regnfast etter 1 time. Sprøyting med Amistar Pro i sterkt solskinn bør unngås på grunn av fare for sviskade.

## **BRUKSRETTLEDNING**

Dosering og sprøytetidspunkt fremgår av doseringstabellen. Best virkning av Amistar Pro oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium. Dosering varierer etter sykdom, splittbehandling og smittepress. Amistar Pro har god langtidsvirkning og beskytter kulturen opp i mot 5-6 uker, avhengig av kornets veksthastighet, smittepress og dosering.

## **BLANDINGER**

Amistar Pro er blandbar med alle viktige soppmidler, insektmidler, ugrasmidler og vekstreguleringsmidler i korn. Blandinger med floghavremidler, mangansulfat, urea og/eller mikronæringsstoff gir økt risiko for sviskader. Ved blanding med etefon-holdig vekstreguleringsmiddel (Cerone) skal Amistar Pro tilsettes først og deretter Cerone. Sørg for god omrøring under hele sprøyteforløpet. La ikke tankblandingen stå uten omrøring. Sjekk alltid anbefalte blandingstabeller vedr. tankblandinger. Bland aldri mer enn to komponenter.

## **VÆSKEMENGDE**

20-30 liter vann pr. dekar.

## DOSERING

Kornart	Sykdom	Dosering	Sprøytetid
<b>Høst- og vårhvete</b>	Brunrust Gulrust Hveteaksprikk (Septoria nodorum) Hvetebladprikk (Septoria triticii) Meldugg Svertesopper	100-200 ml/daa Full dose anvendes ved kraftige angrep eller ved behov for lang virkningstid.	Sprøyt når angrep merkes fra kornets 4-5 bladstadie og fram til senest 6 uker før høsting.  Bruk av Amistar Pro om høsten mot overvintrings-sykdommer er ikke tillatt.
<b>Rug/ Rughvete</b>	Brunrust Grå øyeflekk Meldugg Septoria	100-200 ml/daa Full dose anvendes ved kraftige angrep eller ved behov for lang virkningstid.	Sprøyt når angrep merkes fra kornets 4-5 bladstadie og fram til senest 6 uker før høsting.  Bruk av Amistar Pro om høsten mot overvintrings-sykdommer er ikke tillatt.
<b>Bygg</b>	Brunrust Byggbrunflekk Grå øyeflekk Meldugg Spragleflekk (Ramularia)	100-200 ml/daa Full dose anvendes ved kraftige angrep eller ved behov for lang virkningstid.	Sprøyt når angrep merkes fra kornets 4-5 bladstadie og fram til senest 6 uker før høsting.

## **TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE**

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet og etterfyll med vann under omrøring. Sprøytvæsken holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og ved utsprøyting.

## **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker av naturgummi eller nitril og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes.

## **ADVARSEL**

Amistar Pro har i forsøk og ved praktisk anvendelse i utlandet vist seg å være særdeles skadelig overfor visse eplesorter. Det understrekes derfor at stor forsiktighet må utøves ved sprøyting inntil fruktplantinger, eplehager osv. slik at avdrift unngås.

## **RENGJØRING AV SPRØYTEUTSTYRET**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

## **AVFALLSHÅNDTERING**

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

## **LAGRING**

Må ikke oppbevares i direkte sollys.  
Tåler ikke frost.