

Bruksrettleddningen må følges slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.

Det er forbudt å bruke Apollo 50 SC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Apollo er tillatt brukt i frukttrær, jordbær på friland og i veksthus, bringebær, solbær, pryddplanter i veksthus og på friland, samt i agurk og tomat under oppal.

Behandlingsfrist

Agurk og tomat må kun behandles under oppal. Andre matnyttige vekster må behandles før blomstring eller etter avhøsting.

VIRKEOMRÅDE

Apollo er et kontaktmiddel med lang virkningstid mot egg av frukttremidd og veksthusspinnmidd. Det er noe virkning mot larvestadiet (1. stadium etter egg).

Preparatet virker ikke mot nymfer og voksne midler. Virkningen er spesielt god mot vinteregge av frukttremidd. Apollo er skånsomt overfor rovmidler og nytteinsekter og er godt egnet ved integrert bekjempelse. Resistensutvikling mot preparatet kan ikke utelukkes. For å redusere risikoen, skal preparatet brukes kun én gang pr. vekstsesong. Apollo har vist seg å være skånsomt overfor plantene. Preparatet er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter. Utfør derfor en prøvebehandling på et lite antall planter før et større antall behandles. Dette gjelder særlig verdifulle pryddplanter i veksthus.

VIRKEMÅTE

Kontaktvirkende.

BRUKSRETLEDDNING

Frukttrær

Bruk 40 ml pr. dekar i høvelig vannmengde og sprøyt slik at det oppnås god dekning. Sprøyt på stadiet grønn spiss. På grunn av lang virkningstid og for å redusere risiko for resistensutvikling, skal det sprøytes med Apollo tidlig og kun én gang pr. vekstsesong.

Bærvekster

Jordbær på friland

Bruk 40 ml i 100 liter vann pr. 1000 m planterad like før blomstring.

Jordbær i veksthus

Bruk 40 ml i 100 liter vann. Best virkning oppnås når det er liten bladvekst i plantene.

Bringebær

Bruk 40 ml i 100 liter vann like før blomstring.

Solbær

Bruk 40 ml i 100 liter vann før blomstring eller etter høsting.



MAKHTESHIM
A G A N
HOLLAND B. V.

APOLLO®

50 SC



MOT MIDD

Mot frukttremidd og veksthusspinnmidd i frukttrær, jordbær på friland og i veksthus, bringebær, solbær, pryddplanter i veksthus og på friland, samt i agurk og tomat under oppal.

Formulering : suspensjonskonsentrat
Sammensetning : klofentezin..... 500 g/l
Fyllstoffer 690 g/l
Reg. nr. : 2000.78.03

ADVARSEL

Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Unngå innånding av sprøytetåke.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Agurk og tomat under oppal
Andre vekster Før blomstring eller etter avhøstning

Nettoinnhold: **1Liter**

Importør:

Felleskjøpet Øst Vest
Akersgata 45
0105 OSLO
Norway

Tilvirker:

Irvita Plant Protection N.V.
Member of the Makhteshim-Agan Group
Pos Cabai Office Park, Unit 13
Willemstad - Curaçao
Netherlands Antilles

NO,03/001-1/A/1L

Agurk og tomat under oppal

Bruk 40 ml i 100 liter vann.

Pryddplanter i veksthus og på friland

Bruk 40 ml i 100 liter vann. Best virkning oppnås på planter med avsluttet eller svak vegetativ vekst. Bruk rikelig væskemengde slik at det oppnås god dekning. Ved gjentatte behandlinger mot veksthusspinnmidd anbefales veksling med andre middivirkende midler.

BLANDING MED ANDRE MIDLER

Apollo kan blandes med vanlig brukte sopp- og insektmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og brukstider.

LAGRING

Lagres ved temperaturer over minus 5 °C. Må ikke lagres sammen med mat eller fôr.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker og egnet arbeidstøy ved tillaging av sprøytewæske og ved sprøyting. Ved tåkesprøyting skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

RENGJØRING AV SPREDEUTSTYR

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømtes i sprøyte-tanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøytutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

MERK

Da tilvirker og importør ikke har kontroll med måten preparatet blir brukt på og da det også er mulig at de ulike midlene kan utvikle resistente eller tolerante raser til enhver tid, kan tilvirker og importør ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader eller manglende virkning.

© = Reg. varemerke for Irvita Plant Protection N.V.
Member of the Makhteshim-Agan Group