

L123456 NORW/5L

PIRIMOR®

Pirimikarb - vannløselig granulat

Mot bladlus, også bladlus som er resistent overfor fosformidler.

Virker ikke mot agurkbladlus.

Sammensetning

Pirimikarb 500 g/kg

Fyllstoffer 500 g/kg

Giftig ved svelging (R25).

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging (R48/22).

Irriterer øynene (R36).

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet (R50/53).

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter for frukt, 20 meter for bærbusker, potet og jordbær og 10 meter for kålrot, bete, salat, kinakål og korn.

Giftig for bier og andre insekter.

Giftig for fugl.

Unngå kontakt med øynene (S25).

Unngå innånding av sprøytetåke (S23).

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten hvis mulig (S45).

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn (S1/2).

Inneholder pirimikarb. Kan gi en allergisk reaksjon.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Giftig



Miljøskadelig



BEHANDLINGSFRIST: Agurk, tomat, paprika, salat (friland) og krydder vekster (friland): 4 dager. Konservesert: 10 dager. Jordbær i veksthus: 21 dager. Andre matnyttige vekster: 14 dager.

REG. NR. 2003.102

Avgiftsklasse 4

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Crop Protection A/S
Teglverksveien 9
3400 Lier
Telefon +47 32 85 35 01



L123456 NORW/5L


PIRIMOR®

*Mot bladlus, også bladlus
som er resistent overfor
fosformidler.*

Virker ikke mot agurkbladlus.

1 KG

 syngenta®

Product names marked ® or ™, the
SYNGENTA Logo and the CP FRAME
are Trademarks of a Syngenta Group Company 

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

Pirimor® er tillatt brukt mot bladlus i veksthus: tomat, salat, agurk, paprika, kryddervekster, bringebær, bjørnebær, jordbær og prydvekster.

På friland: korn (hvete, bygg, havre, rug og rughvete), potet, kålrot, sukkerbete, forbete, gulrot, beterot, persillerot, brokkoli, blomkål, hodekål, kinakål, rosenkål, salat, kryddervekster, konserveserter, jordbær, bringebær, bjørnebær, solbær, rips, hageblåbær, eple, pære, plomme, kirsebær og prydvekster.

Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl 0400 til kl 2300 dersom temperaturen overskrider 10°C, eller kl 0600 til kl 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C).

Pirimor® er skånsom mot nyttedyr på friland og i veksthus, så som mariehøner, rovteger, gulløye, snylteveps, bladlusgallmygg, rovmidd m.fl.

Behandlingsfrister

Agurk, tomat, paprika, salat (friland) og kryddervekster (friland): 4 dager.

Konservesert: 10 dager.

Andre matnyttige vekster: 14 dager.

Jordbær i veksthus: 21 dager.

Virkemåte

Pirimor® har rask virkning mot bladlus – også mot bladlus som er blitt resistent mot fosformidler – ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor® gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus.

Bruksveiledning

- 1. Tomat, agurk, salat, paprika, bringebær, bjørnebær, kryddervekster og prydplanter i veksthus:**
Bruk 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann. Maks 1 behandling.
- 2. Hodekål, kinakål, blomkål, brokkoli, rosenkål, gulrot, persille-rot og konserveserter:**
Bruk 50 g Pirimor® pr. dekar. Bruk minst 25 liter vann pr. dekar. Maks 1 behandling.
- 3. Kålrot, forbeter, beterot og sukkerbeter:**
Bruk 30 g Pirimor® pr. dekar: Bruk minst 25 liter vann pr. dekar. Maks 1 behandling.

4. Korn:

Bruk 24 g Pirimor® pr. dekar. Bruk 15-25 liter vann pr. dekar. Maks 1 behandling.

5. Potet:

Bruk 50 g Pirimor® pr. dekar. Bruk minst 25 liter vann pr. dekar. Maks 2 behandlinger.

6. Epler, pærer, kirsebær, plommer, solbær, rips, bjørnebær, bringebær, hageblåbær, kryddervekster og prydvekster på friland:

Bruk 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann. Maks 1 behandling.

7. Salat på friland:

Bruk 30 g Pirimor® pr dekar. Bruk minst 25 liter vann pr. dekar. Maks 3 behandlinger.

8. Jordbær i veksthus:

Bruk 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann. Maks to behandlinger.

9. Jordbær på friland:

Bruk 50 g Pirimor® pr. dekar: Bruk minst 25 liter vann pr. dekar. Maks 2 behandlinger.

Behandlingstid: Ved begynnende angrep.

Forsiktighetsregler

Bruk alltid vernehansker av polykloropren e.l., øyevern, støvler og overtrekksklær når du håndterer og bruker preparatet. Bruk halvmaske med kombinasjonsfilter A2/P2 S og L ved til-laging av sprøytevæske og ved sprøy-ting. Ved tåkesprøyting i veksthus og frukthager anbefales helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 S og L og regntøy.

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22591300. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Foreta kroppsvask etter at arbeidet er ferdig. Overtrekksdress skal destrueres etter bruk. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen. Anbefalt verneutstyr, må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantdeler i en periode på 24 timer etter sprøy-ting.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet helles i sprøytetanken. Rester fra sprøyte-tanken fortynnes om lag 5 ganger med og sprøytes ut i henhold til bruk-srettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Registrerede varemerker:

Syngenta Group Company: Pirimor®