

Mot skadedyr i korn, gras, kløver, korsblomstra fôrvekster, oljevekster, potet, gulrot, kruspersille, rotpersille, knollselleri, bete, ert, bønne, mais, hvitkål, rødkål, spisskål, savoykål, blomkål, brokkoli, purre, vårløk, bringebær, prydblante, salat på friland og gras i grøntanlegg.

SAMMENSETNING:

Alfacypermetrin 50 g/ltr.
Løsningsmidler 856 g/ltr.
Innholder aromatiske hydrokarboner

Brannfarlig. Farlig ved innånding og svelging.
Irriterer luftveiene. Fare for alvorlig øyeskade.
Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.

Giftig for bier og andre insekter.
Unngå innånding av sprøytetåke.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet værnestyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen
(se avfallshåndtering).



Helseskadelig



Miljøskadelig



BEHANDLINGSFRISTER: 14 dager

Avgiftsklasse: 3

Tilvirker:
BASF AGRO BV
Arnhem NL
Wädenswill Branch

Importør:
BASF AS
Leangbukta 40, Postboks 233
NO-1372 Asker, Tel. 66 79 21 00

Opplysninger i nødtilfelle:
Falck Euro Service
Telefon: 0045 79 42 43 33

Reg.nr. 2003.18.06

Nettoinnhold: **1 liter e**

LAGRES FROSTFRITT

Produksjonsnr: Se emballasjen

Produksjons dato: Se emballasjen



BRUKSRETTLEDNING

Maksimalt 2 behandlinger i sesongen i alle kulturene.

Kultur etc.	Skadeinsekter	Dose 1)	Sprøytetid m.m.
Bete	Beteflue, betejordloppe	40 ml	Ved angrep
Ert, bønne	Ertevikler, trips, bladlus		
Mais	Fritflue, kornbladbille		
Hvitkål, rødkål, spisskål, savoykål blomkål brokkoli	Jordlopper, sommerfugllarver, kålfly, kålmøll, skyggevikler, jordfly, teger, nepebladveps j.fl.		
Purre, vårløk	Purremøll, trips, jordfly	30 ml i 100 l vann	På svellende knopper
Bringebær	Bringebærmøll Bringebærbille		Like før blomstring
Prydplanter friland og veksthus	Bladlus (unntatt ferskenbladlus), bartrelus, skjoldlus, veksthusmjøllus (enkelte populasjoner kan være resistente), sikader, teger, rotlus, trips, minerfluer, nattly-, vikler, sommerfugllarver m.fl.		Ved angrep
Gras i grøntanlegg - golfbaner, fotball-baner, grasbaner og parkanlegg.	Hvitaksmidd, timoteiflue, bladlus, minerfluer, fritflue	40 ml	Sist i mai

1) Preparatmengde pr. dekar i 20-40 liter vann hvis ikke noe annet er oppført.

BRUKSRETTLEDNING

Kultur etc.	Skadeinsekter	Dose 1)	Sprøytetid m.m.
Korn	Fritflue, hvete flue, kornjordloppe	40 ml	Når kornplantene har 1-3 blad
	Minerfluer (fluer)	30 ml	Når kornplantene har 3-4 blad
	Minerfluer (larver)	90-120 ml	Holkstadiet
	Bladlus	25 ml	Ved angrep
	Trips, kornbladbill	20 ml	
	Hvetegallmygg	40 ml	
Gras	Hvitaksmidd, timoteiflue, bladlus, minerfluer, fritflue	40 ml	Sist i mai
Kløver	Kløversnutebille	40 ml	Før blomstring
Oljevekster Kålvekster til frø	Rapsglansbille	20-40 ml	Fra tidlig knoppdanning til like før blomstring
	Jordlopper, skulpesnutebille, sommerfugllarver, nepebladveps	40 ml	Ved angrep
Potet	Potetsikade, bladlus, tegeter	40 ml	
Korsbl. fôrvekster	Jordlopper, sommerfugllarver, nepebladveps	40 ml	
Gulrot Knollselleri Kruspersille Rotpersille	Gulrotsflue, gulrotsuger, gulrotsugle, nattfly	40 ml	Under spiring og 2-3 ganger til med ca. 1 ukes mellomrom
	Jordfly, andre bøddellarver, stankelbein, smellere	40 ml	Ved angrep
Salat på friland	Teger, lus, sommerfugllarver	40 ml	Ved angrep

1) Preparatmengde pr. dekar i 20-40 liter vann hvis ikke noe annet er oppført.

Bruksrettlendningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE:

Fastac er tillatt brukt i korn, gras, kløver, korsblomstra förvekster, oljevekster, potet, gulrot, kruspersille, rotpersille, knollselleri, bete, ert, bønne, mais, hvitkål, rødkål, spisskål, savoykål, blomkål, brokkoli, purre, vårløk, bringebær, prydplanter og salat på friland og gras i grøntanlegg. **Preparatet må ikke brukes over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl 0400 til 2300 dersom temperaturen overskrider 10 °C, eller kl 0600 til kl 2200 dersom temperaturen ikke overstiger 10 °C).**

Behandlingsfrist: 14 dager

Fastac 50 anvendes etter behov 1-2 ganger pr. seson.

VIRKEOMRÅDE:

Fastac er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Preparatet er skadelig for rovmidd og nytteinsekter og har lang ettervirkning (8-12 uker). Fastac er skånsom mot planter, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Utfør derfor en prøvesprøyting for et stort antall verdifulle planter behandles hvis det mangler erfaring med arten og sorten.

BLANDING MED ANDRE MIDLER:

Fastac kan blandes med de fleste andre sprøytemidler hvis det er sammenfallende bruksområder og -tider. Bland helst ikke mer enn 2 preparater hvis ikke noe annet er anbefalt.

FORSIKTIGHETSREGLER:

Bruk kjemikaliebestandige vernehansker av PVC eller nitril gummi, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 S og L brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen. Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING:

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold till bruksrettlendningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING: Lagres tørt og kjølig, men frostfritt.

MERK

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, kulturplantesorter, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

Produksjonsår:

Mot skadedyr i korn, gras, kløver, korsblomstra fôrvekster, oljevekster, potet, gulrot, kruspersille, rotpersille, knollselleri, bete, ert, bønne, mais, hvitkål, rødkål, spisskål, savoykål, blomkål, brokkoli, purre, vårløk, bringebær, prydblante, salat på friland og gras i grøntanlegg.

SAMMENSETNING:

Alfacypermetrin 50 g/ltr.
Løsningsmidler 856 g/ltr.
Innholder aromatiske hydrokarboner

Brannfarlig. Farlig ved innånding og svelging.
Irriterer luftveiene. Fare for alvorlig øyeskade.
Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.

Giftig for bier og andre insekter.

Unngå innånding av sprøytetåke.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet værnestyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen

(se avfallshåndtering).



Helseskadelig



Miljøskadelig



BEHANDLINGSFRISTER: 14 dager

Avgiftsklasse: 3

Tilvirker:
BASF AGRO BV
Arnhem NL
Wädenswill Branch

Importør:
BASF AS
Leangbukta 40, Postboks 233
NO-1372 Asker, Tel. 66 79 21 00

Opplysninger i nødtilfelle:
Falck Euro Service
Telefon: 0045 79 42 43 33

Reg.nr. 2003.18.06

Nettoinnhold: **1 liter e**

LAGRES FROSTFRITT

Produksjonsnr: Se emballasjen

Produksjons dato: Se emballasjen

