



Confidor® WG 70

Imidakloprid
Vannløselig granulat

200 g

Mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips m. fl. i agurk, tomat og paprika i veksthus samt pryddplanter i drivbenker og i veksthus.

Sammensetning:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Imidakloprid | 700 g/ kg |
| Spred- og fyllstoffer | 300 g/ kg |



HELSEKADELIG

REG. NR. 2003.37.09

ADVARSEL

Færdig ved svelging.

Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Giftig for meitemark.

Giftig for bier og andre insekter.

Unngå innånding av sprøyteåke.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktingsreglene).

Uskadeliggjør tomentballasje (se avtalslistering).



AVGIFTSKLASSE: 2

Behandlingsfrister:

| | | |
|------------|-----------------------|---------|
| Sprøyting | Agurk, tomat, paprika | 4 dager |
| Rotvanning | Agurk, tomat, paprika | 7 dager |

® = Reg. varemerke for Bayer CropScience

Importør: Bayer CropScience
Postboks 43, N-3165 TJØME
Tlf. 33 39 04 04

Nettoinnhold: 200 g

Bruksrettleddingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Confidor WG 70® i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Confidor WG 70 er tillatt brukt i agurk, tomat og paprika i veksthus samt pryddplanter i drivbenker og i veksthus.

Behandlingsfrister:

| | | |
|------------|-----------------------|---------|
| Sprøyting | Agurk, tomat, paprika | 4 dager |
| Rotvanning | Agurk, tomat, paprika | 7 dager |

VIRKEOMRÅDE

Confidor har meget god virkning mot bladlus, skjoldlus, ullus og mellus (f.eks. veksthusmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer)). Confidor virker også mot biller (f.eks. jordloppe), minérmoll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips (*Frankliniella occidentalis*) er usikker.

VIRKEMÅTE

Confidor tas opp gjennom plantenes blad og stengel, men kan også tas opp gjennom plantenes rotsystem. Confidor virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Confidor er spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på plantene. Overfor insektene har Confidor kontakt- og magevirkning, og virker raskt. God plantevekst er en forutsetning for raskt opptak og god virkning. Ved tilførsel av Confidor med vanning (rotopptak), kan det forventes noe forsinket virkning.

PÅVIRKNING PÅ NYTTEFAUNA

Sprøyting:

Confidor er sterkt skadelig overfor de fleste nytteorganismer, men skånsomt overfor nyttenematoden *Steinernema feltiae*, samt egg av rovmid. Eftervirkning på følsomme nytteorganismer er vanligvis 2-4 uker og for humler og andre pollinatorer opp til 30 dager.

Rotvanning:

Rotvanning med Confidor gir lite påvirkning på de fleste nytteorganismer, men er skadelig overfor rovteger og snylteepsene *Diglyphus isaea* og *Dacnusa sibirica*.

RESISTENS

Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente mot Confidor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente insektpopulasjoner kan ikke forutsies. For å forebygge resistens, bør Confidor brukes i veksling med andre insektmidler med en annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Resistens av enkelte populasjoner av bomullsmellus er påvist i utlandet.

BRUKSRETLEDNING

Tillegging: Fyll halvparten av beregnet vannmengde i sprøyten. Tilsett beregnet mengde Confidor, og fyll etter med vann til beregnet volum sprøytevæske.

Mot bladlus behandles så snart de første bladlusene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet.

Dose: 25 g pr. 100 liter vann.

Mot biller, jordlopper, mellus, minéermøll, sikader, skjoldlus, ullus, sugere, trips m. fl. behandles så snart de første skadeinsektene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10 - 14 dager avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet.

Dose: 35 g pr. 100 liter vann.

Væskemengde:

Rotvanning:

Tillett i følgende kulturer: agurk, paprika, tomat og prydvexster.

Bruk ca. 100 liter sprøytevæske per dekar.

Sprøyting:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Lave planter: | Bruk ca 50 liter sprøytevæske pr dekar. |
| Middels høye planter (ca 50 cm): | Bruk ca 75 liter sprøytevæske pr dekar. |
| Høye planter og prydbusker (ca 1 m): | Bruk ca 100 liter sprøytevæske pr dekar. |
| Svært høye planter (ca 2 m): | Bruk ca 200-300 liter sprøytevann pr dekar. |

PLANTETOLERANSE

Confidor har vært prøvd i snitgerbera, krysanterum, paprika og tomat uten at skade er rapportert. På grunn av skiftende kulturbetainger, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkeltplanter for generell bekjempelse.

BLANDING MED ANDRE MIDLER

Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukerens eget ansvar.

LAGRING

Lagres tørt og kjølig.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker fortrinnsvis av polykloropren, øyvern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk

av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fornyes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksretledningen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

@ = Reg. varemerke for Bayer CropScience



Bayer CropScience