

dimilin®

SC-48

diflubenzuron suspensjonskonsentrat

Mot skadeinsekter på frukttrær og sjampinjong

Sammensetning: Diflubenzuron.....480 g/l
Formuleringsstoffer ...720 g/l



Unngå innånding av sprøytetåke.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter. Giftig for bier og andre insekter. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasje (se avfallshåndtering).

Avgiftsklasse: 3

Behandlingsfrist:

Frukttrær: 4 uker
Sjampinjong: Straks etter torvlegging

Tilvirker:

Crompton Europe B.V.,
Amsterdam, Nederland

Importør:

Mindrebøe Plantevern,
Gydasvei 6, 1413 Tårnåsen

REG.NR.2003.94

Nettoinnhold: **500 ml** e

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke Dimilin SC-48 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Dimilin SC-48 er tillatt brukt på frukttrær og sjampinjong.

Behandlingsfrist: Frukttrær: 4 uker
Sjampinjong: Straks etter torvlegging

VIRKEMÅTE

Dimilin SC-48 hemmer dannelsen av kitin under utvikling av insektenes larvestadier og virker fortrinnsvis som magegift. Mot flere viktige skadedyr gir preparatet meget god virkning mot egg, enten direkte eller ved at voksne hunner får kontakt med stoffet.

Preparatet virker ikke straks. Larvene oppfører seg normalt inntil de skal skifte hud. Døden inntreer ved hudskifte eller ved forpopping. Preparatet virker ikke mot voksne stadier.

INTEGRERT BEKJEMPELSE

Nytteorganismer (insektparasitter, de fleste predatorer og bier)

påvirkes generelt ikke av Dimilin SC-48. Preparatet er derfor godt egnet for bruk i integrerte produksjonssystemer.

BRUKSRETTLEDNING

Generelt. Behandling med Dimilin SC-48 vil bekjempe egg- og larvestadiene og må derfor utføres tidlig. Det vil si før eller under egglegging.

Frukttrær.

Mot larver av frostmålere, bladviklere, nattfly og minermøll, brukes 20-30 ml til 100 liter vann (30-50 ml/daa). Sprøyt ved egglegging og om nødvendig, en gang til 2-4 uker senere. Mot eplevikler, plommevikler og liten fruktvikler får man sikker virkning når det sprøytes like før eller ved begynnende egglegging. Bruk 20 ml til 100 liter vann (30-40 ml/daa) mot eplevikler. Bruk 30 ml til 100 liter vann mot de andre artene. Mot pæresuger. Bruk 20-30 ml til 100 liter vann (30-50 ml/daa). Sprøyt først i juli.

Bruk av Dimilin SC-48 mot skadeinsekter vil gi en del tilleggs-virkning mot bl.a. bladmidder. Følg med på varsel og råd fra veiledningstjenesten.

Sjampinjong.

Mot flue- og mygglarver. Bland 8 ml i 10 liter vann og gi 2,5 liter væske pr. kvadratmeter straks etter torvlegging.

Forsiktighetsregler.

Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved tillaging av sprøytevæske og ved sprøyting. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 S og L brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig.

Rengjøring.

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Avfallshåndtering.

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring. Lagres kjølig.

Hvis det ved bruk av preparatet under særlige forhold skulle oppstå skader, kan selgeren ikke gjøres ansvarlig for disse.

Produksjonsår:

®Registrert varemerke tilhørende CROMPTON EUROPE B.V.