

# Swirski Mite

## Rovmidd (*Amyloseius swirskii*)

Nettoinnhold: 12.500 rovmidd

**Bruksformål:** Til bekjempelse av amerikansk blomstertrips, veksthusmellus og bomullsmellus.

**Sammensetning:** 1,000 ml flaske med rovmidd, nymfer og voksne i kli.



HELSESKADELIG

### ADVARSEL

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Unngå innånding av støv.

Unngå hudkontakt.

Reg.nr.: 2006.26

**Tilvirker:** Koppert BV, Veilingweg 17, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Nederland

**Importør:** VekstMiljø A/S, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

Agurk, tomat, paprika, kryddervekster, jordbær og pryddplanter i veksthus. Ikke anbefalt i tomat, pga. dårlig etablering.

### Virkeområde:

A. *swirskii* bekjemper unge stadier av amerikansk blomstertrips (*Frankinella occidentalis*), samt egg og 1.nymfestadie hos veksthusmellus (*Trioletodes vaporariorum*) og bomullsmellus (*Bremisia tabaci*).

### Virkemåte:

Nymfer og voksne av A. *swirskii* stikker munndelene inn i byttet og suger ut kroppsvæsken av byttedyret. Byttedyret skrumper inn etter å ha blitt sugd ut, og er derfor vanskelig å oppdage i kulturen.

### Utseende:

Egg: avlange, transparent hvite

Nymfer og voksne: beigerosa, dråpeformet, litt nedtrykt med korte bein.

### Klimakrav:

Middelen jobber optimalt ved temperaturer mellom 25-28 °C og luftfuktighet 60-90 %. Under 15 °C er middelen inaktiv.

### Bruksrettledning:

Rist og vend flasken forsiktig før innholdet henges på infiserte planter, eller legges på dyrkingsmediet

	Ant/ m <sup>2</sup>	Ant. m <sup>2</sup> / 12.500 dyr	Intervall	Ant. behandlinger
Forebyggende	20	625	-	1 x
Lett bekjempelse	50	250	-	1 x
Kraftig bekjempelse	100	125	-	1 x

### Integrert plantevern:

Kan brukes sammen med andre nyttedyr. Ved bruk av kjemiske plantevernmidler, bruk midler som er skånsomme for nyttedyr. Ta ellers kontakt med importør.

### Oppbevaring:

Rovmidd kan oppbevares mørkt ved 10 - 15 ° i maks 1 - 2 dager. Flasken bør ligge.

### Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

### Avfallshåndtering:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

**Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.):** se forpakningen.

# Swirski Mite Plus

## Rovmidd (*Amyloseius swirskii*)-småpakker

Nettoinnhold: 100/500 småpakker med 250 stk. midd

**Bruksformål:** Til bekjempelse av amerikansk blomstertrips, veksthusmellus og bomullsmellus.

**Sammensetning:** Småpakker med krok; med rovmidd, lagringsmidd og kli.



HELSESKADELIG

### ADVARSEL

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Unngå innånding av støv.

Unngå hudkontakt.

Reg.nr.: 2006.26

**Tilvirker:** Koppert BV, Veilingweg 17, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Nederland

**Importør:** VekstMiljø A/S, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

**Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

### Bruksområde:

Agurk, tomat, paprika, kryddervekster, jordbær og pryddplanter i veksthus. Ikke anbefalt i tomat, pga. dårlig etablering.

### Virkeområde:

A. swirskii bekjemper unge stadier av amerikansk blomstertrips (*Frankinella occidentalis*), samt egg og 1.nymfestadie hos veksthusmellus (*Trioletodes vaporariorum*) og bomullsmellus (*Bremisia tabaci*).

### Virkemåte:

Nymfer og voksne av A. swirskii stikker munndelene inn i byttet og suger ut kroppsvæsken av byttedyret. Byttedyret skrumper inn etter å ha blitt sugd ut, og er derfor vanskelig å oppdage i kulturen.

### Utseende:

Egg: avlange, transparent hvite

Nymfer og voksne: beigerosa, dråpeformet, litt nedtrykt med korte bein.

### Klimakrav:

Middens jobber optimalt ved temperaturer mellom 25-28 °C og luftfuktighet 60-90 %. Under 15 °C er middens inaktiv.

### Bruksrettleiding:

Posene henges opp i plantene eller legges på dyrkingsmediet.

	Ant poser/ m <sup>2</sup>	Intervall (dager)	Ant. behandlinger
Forebyggende	0,4	42	-
Lett bekjempelse	0,4	28	-
Kraftig bekjempelse	1	28	-

### Integrert plantevern:

Kan brukes sammen med andre nyttedyr. Ved bruk av kjemiske plantevernmidler, bruk midler som er skånsomme for nyttedyr. Ta ellers kontakt med importør.

### Oppbevaring:

Rovmidd kan oppbevares mørkt ved 10 - 15 ° i maks 1 - 2 dager.

### Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

### Avfallshåndtering:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

**Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.):** se forpakningen.