

# Teldor® Hobby



## Mot gråskimmel, grå monilia og gul monilia

på søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær, tomat og prydplanter på friland og i veksthus.

Tillatt bruk i hobbyhager etc.

### Bayer Garden



Gråskimmel



## Teldor® Hobby

### Mot gråskimmel, grå monilia og gul monilia

på søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær, tomat og prydplanter på friland og i veksthus.

Tillatt bruk i hobbyhager etc.



#### Sammensetning:

Fenhexamid ..... 500 g/kg

Sprede- og fyllstoffer ..... 500 g/kg

#### ADVARSEL

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannforende grøfter, bekk, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter ved sprøyting i trær (frukttrær og prydtrær), og 5 meter i bærbusker.

Unngå innånding av sprøyteåke.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktigheitsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



## Teldor® Hobby

### Mot gråskimmel, grå monilia og gul monilia

### Bayer Garden

#### Teldor® Hobby

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Teldor Hobby er tillatt bruk mot gråskimmel, grå monilia og gul monilia på søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær, tomat og prydplanter på friland og i veksthus. Tillatt bruk i hobbyhager etc.



#### Behandlingsfrist

Plomme	4 uker
Sur- og søtkirsebær, bringebær	14 dager
Jordbær friland	7 dager
Jordbær veksthus	14 dager
Tomat	3 dager

Øvrige bærvekster behandles før kartdanning.

**Bruksrettledning:** Se vedlegg

#### Forsiktigheitsregler

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

#### Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken.

Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skill sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for foreurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyrten rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskekemiddel.

#### Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

**Lagring:** Tørt og kjølig



Tilvirker:  
Bayer AG, Leverkusen, Tyskland

Importør:  
Bayer AS, PB 14, 0212 Oslo  
[www.bayergarden.no](http://www.bayergarden.no)



# Teldor® Hobby

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Teldor Hobby er tillatt brukt mot gråskimmel, grå monilia og gul monilia på søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær, tomat og prydplanter på friland og i veksthus. Tillatt bruk i hobbyhager etc.

## Sammensetning:

Fenhexamid 500 g/kg  
Sprede- og fyllstoffer 500 g/kg

## ADVARSEL

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter ved sprøyting i trær (fruktrær og prydtrær), og 5 meter i bærbusker.

Unngå innnåding av sprøytetåke.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktigheitsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Avgiftsklasse: 6

## Behandlingsfrist:

Plomme	4 uker
Sur- og søtkirsebær, bringebær	14 dager
Jordbær friland	7 dager
Jordbær veksthus	14 dager
Tomat	3 dager

Øvrige bærvekster behandles før kartdanning.

## Bruksrettledning: Se baksiden

## Forsiktigheitsregler:

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

## Rengjøring:

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskekemiddel.

## Avfallshåndtering:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## Lagring: Tørt og kjølig

## Virkemåte

Teldor Hobby påvirker nyttefauna i liten grad.

Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning. Teldor har god regnfasthet og lang virkningsstid. Det kan ikke utelukkes at det opptrer soppraser som er resistente mot Teldor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente soppraser kan ikke forutses. For å forebygge resistens, bør Teldor brukes i alternering med andre soppmidler med en annen virkningsmekanisme. For å motvirke resistensutvikling bør Teldor maksimalt brukes 2 ganger i samme kultur pr. vekstsesong.

## Bruksrettledning

**Tillaging:** Fyll sprøyten halvt med vann. Tilsett beregnet mengde Teldor og full etter med vann til beregnet volum sprøytevæske.

**Væskemengde:** Bruk en væskemengde som sørger for at alle plantedeler dekkes med sprøytevæske.

Særlig er virkningen mot gråskimmel avhengig av jevn fordeling av preparatet og at alle blomster dekkes med sprøytevæske.

**Dosering:** Bruk 1 pose til 7,5 liter vann. Se også sprøytabell.

## Plantetoleranse

Teldor er generelt et skånsomt preparat. Det er under normale sprøyteforhold ikke meldt om skade på de vanligste sortene av frukt og bær. På prydvekster kan Teldor gi noe synlig belegg på lyse blomster. På grunn av skiftende kulturbetingelser, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkelplanter før generell bekjempelse

Bruk 1 pose pr. 7,5 liter vann	
HVOR – MOT HVA	NÅR/HVORDAN
<b>Steinfrukt (plomme, sur- og søtkirsebær)</b> Mot grå monilia Mot grå monilia og gul monilia Mot gråskimmel	Sprøytes 1 – 2 ganger under blomstring Sprøytes etter blomstring og på kart. Sprøytes ca. 2 – 4 uker før høsting.
<b>Brindegær, hageblåbær, rips, solbær og stikkelsbær</b> Mot gråskimmel	Bruk ca. 5 liter væske til 10 m rad. Sprøyte ved behov med 1 – 2 ukers mellomrom fra begynnende blomstring fram til kartdanning.
<b>Jordbær på friland og i veksthus</b> Mot gråskimmel	<b>Væskemengde:</b> Enkeltrad: 1 liter pr meter Dobbeltrad: 1 liter pr 0,8 meter Sprøyt ved behov fra begynnende blomstring.
<b>Tomat og prydplanter på friland og i veksthus</b> Mot gråskimmel	Sprøytes ved angrep.

Reg.nr. 2007.136

Netto: 3,75 g

Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

Importør: Bayer AS, Oslo



Bayer Environmental Science

vend