

Prestige® FS 370

Behandling av settepoteter ved utsortering:

Behandling med Prestige FS 370 kan gjøres ved utsortering av settepoteter. Det er viktig at potetene er frie for jord slik at Prestige FS 370 kommer i god kontakt med svartskurvsklerotiene (hvilelegemer).

Behandling av settepoteter som er lagt til for- groing:

Behandlingen utføres like før groene stikker frem. Dermed unngås smitte på gropiggene.

Dosering:

Bruk 600 ml per tonn settepoteter. Ved behandling med f. eks. "Mantis-anlegg" kan Prestige FS 370 brukes ufortynnet, men kan også blandes ut med noe vann om det er ønskelig. Normalt brukes en total væskemengde på 1 liter væske pr tonn settepoteter.

Behandling ved setting:

Prestige FS 370 sprøytes på med sprayings- aggregat i setteren eller direkte på fallende poteter. Begge utstyrene er påmontert potetsetteren. Det er viktig å dekke settepotetenes overflate så godt som mulig med sprayevæska for å bekjempe smitten. Det bør brukes to dyser per rad.

Dosering: Bruk 600 ml per tonn settepoteter

Dersom man beiser med Prestige FS innedørs, SKAL det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med én gang etter beisingen og FØR de settes til videre oppbevaring.

BEISETEKNISKE FORHOLD/ RAD- AVSTAND VED BEISING I SETTER

Ved beising i setteren (Viby, Wassèn) brukes så liten væskemengde som mulig. Bruk 2 – 4 ltr/ tonn poteter. Sørg for at dysene er montert ca. 20 cm fra medbringer- kjedet, slik at væsken ikke treffer dette. Ved bruk av "Hardi teknikken" sprøytes potetene under fritt fall fra setteren mot jorda. Det monteres to dyser per rad med en innbyrdes avstand på 25 cm. Dysene stilles slik at de dekker potetene fra 2 forskjellige sider. Dysene skal peke skrått nedover i vinkler på

henholdsvis 25° og 35°. Så lenge det kan medføre økt smitterisiko for stengelbakteriose (blotråte) er det viktig at dysene stilles inn på en slik måte at væskedusjen ikke treffer medbringerkjedene. For å hindre at midlet storkner og man får en tilstopping av dysene bør det skylles gjennom slanger og dyser hver dag etter endt beising. Beising av lysgrodde poteter er også mulig.

Eksempelvis for setting ved

Rad- avstand	Dysenr.	Km/h	Trykk	Vann
0,75	2x1299-8	6	2,5	7 l/ daa
0,80	2x1299-8	6	2,9	7 l/ daa
0,75	2x1299-8	7	3,4	7 l/ daa
0,75	2x1299-8	7	3,9	7 l/ daa

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes for bruk.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING

Skyll beiseutstyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Ubenyttet beiset settepoteter må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Må lagres frostfritt

Prestige® FS 370

MERK


Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group



Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 14
N-0212 Oslo
Tlf. 91 14 71 60



Prestige® FS 370

Pencycuron og Imidakloprid
Suspensjonskonsentrat

5 liter

Kombinert sopp- og insektmiddel til beising mot svartskurv og sugende insekter i potet.

Sammensetning:
Pencycuron 250 g/l
Imidakloprid 120 g/l
Vann og fyllstoffer 771,6 g/l

ADVARSEL

Farlig ved svelging.
Inneholder Preventol. Kan gi en allergisk reaksjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Giftig for meitemark.
Giftig for bier og andre insekter.


VED SVELGING:

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ lege ved ubehag.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Reg.nr. 2008.71.14

AVGIFTSKLASSE: 1

Reg.nr. 2008.71.14



NO05845377E

Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 14
N-0212 Oslo
Tlf. 91 14 71 60

Prestige® FS 370

Bruksrettleddingen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke Prestige® FS 370 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Prestige FS 370 er et flytende kombinert sopp- og insektmiddel til beising mot svartskurv og sugende insekter i potet.

VIRKEOMRÅDE

Prestige FS 370 er et beisemiddel bestående av de to virksomme stoffene pencycuron og imidakloprid. Preparatet er formulert som et vannbasert, flytende beisemiddel.

Pencycuron er et kontaktvirkende soppmiddel med spesielt god effekt mot svartskurv (**Rhizoctonia solani**).

Imidakloprid er et insektmiddel med sterk systemisk effekt som har god virkning mot sugende skadedyr som bladlus, sikader og teiger.

VIRKEMÅTE

Prestige FS 370 er et kombinasjonsmiddel med de to aktive substansene pencycuron og imidakloprid. Pencycuron, som virker mot svartskurv, har kontaktvirkende effekt, og effekten sikres ved god dekning av materialet som behandles. Imidakloprid, som har en systemisk virkning mot sugende insekter, tas opp av røttene og transporteres til kulturens overjordiske deler hvor den beskytter mot sugende skadedyr som bladlus og sikader. Beising med Prestige FS 370 kan dermed erstatte tidlige sprøytinger mot disse skadedyrene.

BRUKSRETTELNING

Det er viktig med en jevn og god fordeling av produktet på hele overflaten på potetene for å sikre en god effekt. Væskemengde (preparat pluss vann) tilpasses etter respektive påføringsmetoder og utstyr.

Settepotetene er den viktigste smitekilden for svartskurv (svarte hvilelegemer), men jordsmitte er også vanlig. Forkultur og omløp har stor betydning for jordsmitte.

Der man årlig har tidlig angrep av sikader, eller når man vet at man av klimatiske forhold kan påregne tidlig angrep av dette skadedyret, vil man med en behandling med Prestige FS 370 kunne bekjempe slike tidlige angrep på potetplantene.

RIFMO	PMR: NO05845377E	Bayer CropScience DK	
	Form.: 576x150,5 mm	Date: 03-11-2014	<input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 9823A	Country: NO	<input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.: 34-4332/2232	Colour: CMYK	