

# Fenix®

med denne blandingen anbefales det å konsultere lokal rådgiving for produktene blandes.

#### Fra frobladstadiet til gulrota har 2-3 varige blad:

Ved sprøyting på frobladstadiet til gulrota bruk 30 ml Fenix per daa. Ved sprøyting på senere stadier bruk 25 - 100 ml Fenix per daa i kombinasjon med Sencor WG®. For dosering, se etikett for Sencor WG®. Blanding er mest aktuelt der då, balderbrå og åkersvineblom er et problem. Bruk maks 175 ml Fenix per daa per år og sprøyt maks tre ganger per år.

#### POTETER

##### Under plast og fiberduk

Bruk 100 ml Fenix per daa rett etter setting, men før legging av plast/ fiberduk. På grunn av damptrykk og lite vokslag kan kulturen hemmes i vekst. Lufting må utføres ved høy temperatur i spiringsfasen!

Fenix kan eventuelt blandes med Sencor WG® for bredere virkeområde. Bruk da 70-80 ml Fenix + 11 g Sencor WG® per daa. Fenix kan også blandes med Centium®1. Siden det er begrenset erfaring med blanding av Fenix og Centium®1 anbefales det å konsultere lokal rådgiving før produktene blandes.

#### På friland

Bruk 150 - 175 ml Fenix sammen med 10 - 20 g Sencor WG® eller 3 g Titus®2 per daa. Sprøyt på oppspirt eller spirende ugras senest 5 dager før potetene spirer.

#### ERTER

Bruk 75 - 100 ml Fenix per daa sammen med 50 - 80 g Basagran®3 SG per daa når ertene er 5- 8 cm (4 nodier).

#### LØK

Fenix er kun godkjent i satt løk (ikke i stikkløkproduksjon).

#### Satt løk på friland og under plast:

Bruk 55 - 100 ml Fenix per daa for ugraset spirer. Laveste dose under plast! Sprøyt videre utover i sesongen etter behov på nyspirt ugras med 25-100 ml Fenix per daa. Bruk maks 175 ml Fenix per daa per år og sprøyt maks tre ganger per år.

Fenix kan brukes sammen med Lentagran fra løken spirer og ca 5 uker framover. Kombinasjonen med Lentagran forsterker effekten av preparatene. Vær oppmerksom på at sen behandling gir økt fare for skade.

#### DILL

Bruk 150 - 175 ml Fenix per daa for oppspiring av ugraset og senest 5 dager før spiring av kulturveksten.

#### KRUSPERSILLE/ BLADPERSILLE

Bruk 150 - 175 ml Fenix per daa før oppspiring av ugraset og senest 5 dager før spiring av kulturveksten.

#### ANTALL BEHANDLINGER/MAKSIMAL DOSERING PER ÅR

Kultur	Maks. antall behandlinger	Maksimal dose pr år
Gulrot friland	3	175 ml/daa
Gulrot under plast og fiberduk	1	175 ml/daa
Poteter	1	175 ml/daa
Erter	1	100 ml/ daa
Løk	3	175 ml/daa
Dill	1	175 ml/daa
Kruspersille/ bladpersille	1	175 ml/daa

#### PRODUKTBEGRENSNINGER

Fenix kan under visse omstendigheter gi gulfarging og klorose på kulturveksten. Avling vil i de fleste tilfeller ikke påvirkes negativt av dette, men det bør tas hensyn til og i størst mulig grad unngås. Symptom/ skade sees særlig ved følgende forhold:

- Betydelig nedbør like etter bruk av Fenix, særlig på lett jord.
- Nattefrost etter behandling.
- Ved behandling i det kulturplanten bryter jordskorpen.
- Ved dekking av plast eller fiberduk med påfølgende høy temperatur med begrenset lufting og/ eller dårlig utviklet vokslag. Særlig ved bruk av plast må det utvises stor forsiktighet.
- Blanding med andre ugrasmidler øker faren for skade!

#### ETTERFØLGENDE KULTURER

Fenix brytes raskt ned. Det er derfor ingen begrensninger for valg av etterfølgende kulturer. For dyrking av korsblomstra kulturer, f. eks vinterkål og høstoljevekster, på arealer som er behandlet med Fenix samme år, kreves en dyp god ploying for annen jordbearbeiding.

#### SPRØYTETEKNIKE FORHOLD/VALG AV DYSER

Fenix sprøytes ut i minimum 20 liter vann per daa. Væskemengden økes med plantetetthet og ugrasbestand.

Normalt kan godt resultat oppnås ved bruk av LowDrift dyser. Etter at kulturen har spirt frem benyttes alltid LowDrift dyser, se tabell:

# Fenix®

Dyse	Trykk	Hastighet	Vannmengde
ISO 110 030 (blå)	2,8 bar	7,0 km/t	20 ltr/ daa
ISO 110 040 (rød)	2,5 bar	5,8 km/t	30 ltr/ daa

#### TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKEN

Fyll sprøytetanken med halvparten av den vannmengden som skal brukes. Start omrøringen og tilsett den tilmålte mengde Fenix. Etterfyll med resten av vannmengden. Sørg for god omrøring før og under utsprøyting.

#### LAGRING

Må lagres frostfritt.

#### FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/neopren av god kvalitet, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsolte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).**

#### Håndteringsfrist

Vernehansker, overtrekksdress og støvler må nyttes dersom en går inn i behandlet område i en periode på 24 timer etter sprøyting.

#### RENGJØRING AV SPREDEUTSTYR

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tomnes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted

som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

#### MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning.

Bruksrettleddningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® = Reg. varemerke for Bayer CropScience

®1 = Reg. varemerke for FMC Chemicals

®2 = Reg. varemerke for DuPont

®3 = Reg. varemerke for BASF



# Fenix®

Aklonifen  
Suspensjonskonsentrat

5 liter

**Mot frogras i poteter, gulrot, erter, løk, dill og kruspersille/ bladpersille.**

<b>Sammensetning</b>	1,2-benzisotiazolin-3-on	1,1 g/l	
Aklonifen	600 g/l	Løsningsmidler	590 g/l

#### ADVARSEL

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter. Unngå innånding av aerosoler. Tilsolte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Oppbevares innelåst. Oppbevares utliggjelig for barn.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Reg.nr. 2013.19

**Importer:**  
Bayer AS  
Bayer CropScience  
Postbox 14 N-0212 Oslo Tlf. 91 14 71 60

**AVGIFTSKLASSE: 3**

**Tilvirker:**  
Bayer CropScience AG  
Monheim, Tyskland

NO0562605G

# Fenix®

**Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Fenix® i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.**

#### BRUKSOMRÅDE

Fenix er tillatt brukt i poteter, gulrot, erter, løk, dill og kruspersille/ bladpersille.

#### VIKKEOMRÅDE

Fenix har meget god effekt mot de fleste ettårige ugrasarter. Effekten avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Virkningen er best når en sprøyter på nyspirt eller spirende ugras. Virkningen blir dårligere ved høyt moldinnhold. Dette motvirkes ved å sprøyte på nyspirt ugras, ved å øke dosen eller ved å blande med andre ugrasmidler. Effekten av Fenix og andre preparater forsterkes mot en del ugras når de blandes.

**Fenix har meget god effekt** mot gjeteraske, klengemauere, meldestokk, pengeurt, smånesle, vassarv, froplante av dylle, åkerull og åkerminneblom.

**Effekten er god mot** balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, veronika, åkerstemor, knereverumpe og tunrapp.

**Variabel effekt** mot vindelslirekne og åkersvineblom.

**Effekten** er svak mot då.

Der då, balderbrå og åkersvineblom er et problem, må Fenix brukes i kombinasjon med andre preparater.

**Virkemåte**  
Fenix er et jordvirkende kontaktmiddel og planten blir eksponert for midlet i det den vokser gjennom jordsjiktet. Etter noen dager stopper veksten og ugrasplantene visner og dør.

Radrensing/hypping etter sprøyting ødelegger ugrasvirkingen. En bør derfor ikke gå i gang med slike arbeidsoperasjoner i radkulturer for ny ugrasspining blir registrert

eller før slutthypping i potet.

#### Jordas påvirkning

God jordbearbeiding og et såbed uten klumper gir best effekt av en behandling med Fenix. Ugrasvirkingen bortfaller dersom jorden tromles eller bearbeides etter sprøyting.

Fenix effekt avhenger av jordtype. Bruk minste anbefalte dose på lett humusfattig jord og største dose på tung og humusrik jord.

#### Klimaets påvirkning

Temperaturen bør være over 6°C ved utsprøyting. Høyere temperatur vil gi en raskere virkning. Nedbør etter sprøytingen vil fremme effekten. Store nedbørmengder kort etter sprøyting kan skade kulturen.

#### BRUKSRETLEDDNING

Fenix anbefales generelt i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler. Fenix virker ved lave temperaturer og tørre forhold, men best effekt oppnås ved stigende temperatur og god jordfuktighet. Mest skånsomt er Fenix ved temperatur over 10 °C. Det bør unngås å bruke Fenix ved utsikt til nattefrost.

#### GULROT

Bruk maks 175 ml Fenix per år. Maks 3 behandlinger per år.

#### Under plast og fiberduk

Bruk 50 - 100 ml Fenix per daa rett etter såing. På grunn av damptrykk og lite vokslag kan kulturen hemmes i vekst. Lufting må utføres ved høy temperatur i spiringsfasen!

Fenix bør benyttes i en bekjempelsesstrategi med Sencor WG®. Se etikett for denne.

#### På friland

##### Før oppspiring:

Bruk 50 - 150 ml Fenix per daa.

Ved problemer med svarsotvier kan Fenix blandes med Centium®1 for spiring. Siden det er begrenset erfaring

RIFMO	<b>PMR: NO05626055G</b>	<b>Bayer CropScience DK</b>	
	Form.: 576x150,5 mm	Date: 06-12-2013	<input type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 9823A	Country: NO	<input checked="" type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.: 33-4279/2079	Colour: <b>CMYK</b>	