

Milbeknock®

Milbemektin emulsjon.

Mot midd og minérfluelarver i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Sammensetning: Milbemektin 9,3 g/l - Fyllstoffer 920,7 g/l
Inneholder aromatiske hydrokarboner

FARE

Brannfarlig væske og damp.

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannforende grøfter, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter i jordbær og 30 meter i prydplanter og frukt.

Giftig for meitemark.

Giftig for bier og andre insekter.

Unngå innånding av damp/aerosoler.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFT-INFORMASJONEN/en lege.

IKKE framkall brekning.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Behandlingsfrist:

Eple og pære: 14 dager

Jordbær behandles kun etter høsting

Reg. nr: 2013.2.14

Tilvirker:

Mitsui Chemicals Agro, Inc., Japan

© Reg. varemerke for Mitsui Chemicals Agro, Inc., Japan

Avgiftsklasse 3

Importør:

Felleskjøpet Agri, Flyporten, 2060 Gardermoen

INNHOLD:

1 liter

Bruksrettleddning må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

Bruksområde

Milbeknock er tillatt i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Virkeområde

Milbeknock er et selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd, dvergmid (bl.a. skuddtoppmidd, cyclamenmidd), frukttremidd, jordbærmidd og minerfluelarver. Milbeknock har virkning mot samtlige stadier fra egg til voksen midd.

Virkemåte

Milbeknock virker raskt både ved kontakt og opptak gjennom munnen ("knock-down" effekt) samt god langtidsvirkning. Virkningen er ikke spesielt temperatur-avhengig.

Nytteinsekter

Milbeknock er skånsomt ovenfor visse nytteinsekter, men en midlertidig reduksjon i populasjonen like etter behandling må påregnes. Rovmidd påvirkes vesentlig. Milbeknock er giftig for bier og må ikke brukes i blomstrende kulturer.

Resistensstrategi

Milbeknock inneholder det aktive stoffet milbemektin, som tilhører middelgruppe 6: Avermektin og milbemyciner. Milbemektin og abamektin tilhører samme middelgruppe, og kryssresistens mellom midler med disse aktive stoffene kan derfor oppstå.

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsluttet følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Det maksimale antall behandlinger med Milbeknock, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettleddningen, må ikke overskrides for gruppen avermektin og milbemyciner.

Bruksrettleddning

Milbeknock er ikke systemisk i plantene, men det transporteres i bladkjøttet, fra den ene til den andre siden (translaminaer). Alle relevante plantedeler må dekkes med sprøytevæske.

Eple/pære

Mot frukttrespinnmidd og veksthuspinnmidd kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse.

Dosering: 115 ml Milbeknock i 100 l vann. Bruk 50 l vann pr. 100 m rad

Maks arealdose: 2 x 115 ml pr. dekar.

Milbeknock vil også ha en viss sideeffekt mot bladmidd. Milbeknock skal maksimalt brukes 2 ganger per vekstsesong.

Jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland

Mot veksthuspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Det er en fordel å avblade jordbærplantene før sprøyting. Mot tydelige angrep av jordbærmidd er to behandlinger nødvendig. Mot spinnmidd må sprøyting skje for dannelse av dvalehunner (oransje individer) og mot jordbærmidd må sprøyting være avsluttet før første frost.

Bruk 250 ml Milbeknock i minst 120 l vann pr. 1000 m rad eller dekar ved full bladmasse.

Maks arealdose: 2 x 250 ml pr. dekar.

Milbeknock skal maksimalt brukes 2 ganger i veksthus og 1 gang på friland og i plasttunnel per vekstsesong.

Prydvækster i veksthus, grøntanlegg og planteskoler utendørs

Mot veksthuspinnmidd og dvergmid (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep. Konsentrasjonen er 50 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer med plantestørrelsen.

Opp til 50 cm planthøyde bruk 50 ml i 100 l vann pr. dekar.

50-125 cm planthøyde bruk 75 ml i 150 l vann pr. dekar.

Over 125 cm planthøyde bruk 100 ml i 200 l vann pr. dekar.

Maks arealdose: 2 x 2 x 100 ml pr. dekar.

Mot minerfluelarver sprøytes det når angrepet konstateres. Konsentrasjonen er 100 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer etter plantestørrelse.

Opp til 50 cm planthøyde bruk 100 ml i 100 l vann pr. dekar.

50 - 125 cm planthøyde bruk 150 ml i 150 l vann pr. dekar.

Over 125 cm planthøyde bruk 200 ml i 200 l vann pr. dekar.

Maks arealdose: 2 x 2 x 200 ml pr. dekar.

Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret.

Tillaging av sprøytevæske

Fyll tanken halvfull med vann. Tilsett Milbeknock under omrøring og fyll opp med vann.

Blanding

Blanding med andre midler er ikke tilstrekkelig undersøkt, og derfor frarådes dette. Klebemiddel kan tilsettes sprøytevæska, når det er vanskelig å fukte bladene.

Plantetoleranse

Milbeknock er generelt et skånsomt middel, og er testet i mange arter og sorter uten skade. Produzenten kan ikke garantere for selektiviteten i alle kulturer (dette er avhengig av f.eks. planteart/-sort, dyrkingsteknikk, f.eks. bruk av tunnel, og klimaforhold). Det er derfor viktig å gjøre en liten prøvesprøyting innen kulturen behandles. Dette må også gjøres ved tilsetning av klebemiddel.

Lagring

Milbeknock lagres tørt og kjølig, men frostfritt.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av nitrilgummi, øyevern og overtrekksdress ved tillaging av sprøytevæske.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Rengjøring

Sprøytestyret rengjøres godt **før** bruk av Milbeknock. Tomemballasje skylles minst 3 ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken.

Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøytestyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparater og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede effekt.

Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet brukes på en annen måte, eller under andre forhold enn de som er beskrevet på etiketten, bortfaller vårt ansvar.