



Luna[®]
PRIVILEGE


Fluopyram
Suspensjonskonsentrat

1 liter

Mot soppsykdommer i eple og pære.

Sammensetning:

Fluopyram 500 g/l
Spred-, klebe- og fyllstoffer..... 720 g/l



Giftig med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kan forårsake grunnvannsforurensning.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

REG. NR. 2015.51
AVGIFTSKLASSE:3

Behandlingsfrist:
Eple og pære:14 dager



NO79978308A

Reg. nr.: 2015.51

UN 3082



Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 193
1325 Lysaker
Tlf. 91 14 71 60

Bayer

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| RIFMO | PMR: NO79978308A | Bayer CropScience DK | |
| | Form.: 297x150 mm | Date: 05-01-2016 | <input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections |
| | Artwork: 4942D | Country: NO | <input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server |
| | Job no.: 36-4390/2190 | Colour: CMYK | |

Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Luna® Privilege i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Luna Privilege er tillatt brukt i eple og pære.

Behandlingsfrist:

Eple og pære: 14 dager

VIRKEOMRÅDE

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg, og god sideeffekt mot skurv, grå og gul monilia, kjølelagersopp og bitteråte.

VIRKEMÅTE

Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider. Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra sporing til sporulering.

Luna Privilege virker systemisk, og opptak av produktet skjer både gjennom blader og røtter. Den translaminære virkningen gjør at det virksomme stoffet trenger inn gjennom overflaten og fordeler seg i bladvevet. Samtidig vil produktet tas opp i roten og transporteres oppover i planten med saftstrømmen. Deler av planten som ikke får direkte treff av sprøytedusjen vil dermed også bli beskyttet sammen med nye blad som vokser ut.

RESISTENS

Resistens mot et soppmiddel eller andre midler med samme virkningsmekanisme kan oppstå etter gjentatt bruk av slike midler. For å motvirke resistensutvikling, må en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme. Risikoen for at det utvikles resistens mot den kjemiske gruppen som Luna Privilege tilhører regnes som moderat til høy. For å redusere risikoen for utvikling av resistens bør Luna Privilege derfor benyttes forebyggende og i strategier med midler med en annen virkemekanisme. Selger påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade som følge av feilaktig bruk av produktet, og står ikke ansvarlig for manglende effekt ved en eventuell dannelse av resistens mot produktet.

BRUKSRETLEDDNING

Tillaging av sprøytevæske

Fyll sprøyten ca. 2/3 med vann. Tilsett oppmålt mengde Luna Privilege under omrøring og fyll etter med vann til ønsket væskemengde. Ved bruk av fylleutstyr ved tankblanding er det viktig at det ene produktet er helt tomt før det neste tilsettes. Pass på at omrøringen er i gang også ved eventuelle arbeidspauser.

Væskemengde: Bruk en væskemengde som dekker alle plantedeler med sprøytevæske.

Normalvæskemengde

Dose er oppgitt i preparatmengde per dekar. Normal væskemengde er angitt i liter per dekar og i liter per 100 m rad for normal plantehøyde (2-3 m) og med moderat dråpestørrelse i sprøytedusjen (se tabell). Ved avvik fra oppgitt normal plantehøyde, endres væskemengde og dermed dose.

| | Radavstand: | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|-------|-----|
| | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m |
| | Væskemengde per 100 m rad: | | | |
| Væskemengde: 100 l per dekar | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Væskemengde: 75 l per dekar | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Væskemengde: 50 l per dekar | 17 | 20 | 23 | 25 |
| Væskemengde: 40 l per dekar | 14 | 16 | 18 | 20 |

I tettplantinger/"slank spindel" av eple brukes det 14 - 40 liter per 100 m rad (kjøring mellom radene) fra blomstring. I større trær (2,5 - 3 m trehøyde og 2 - 2,5 m kronediameter) brukes 40-50 liter per 100 m rad. Før blomstring og i nyplantinger reduseres væskemengden.

Bruk maks 100 liter væske per dekar.

Dose

Bruk 20 ml Luna Privilege per daa. Doseringen tilpasses smittetrykk og sortens mottakelighet for soppen og hvilken sykdom som skal bekjempes. Maksimal dekadose må ikke overskrides.

Maks 1 behandling per år.

Behandlingsfrist: 14 dager.

Mot mjøldogg ved angrep fra "tett klynge" og frem til modning (BBCH 55-87).

BLANDING MED ANDRE MIDLER

Preparater i blanding kan utfylle hverandre i virkning, men kan også føre til effekter som ikke er påvist i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukers eget ansvar.

LAGRING

Lagres frostfritt.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/neopren av god kvalitet og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftnformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøyteanken. Rester fra sprøyteanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesortertes. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og erfaring. Dersom preparatet brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group



Luna[®]

PRIVILEGE

Fluopyram
Suspensjonskonsentrat

1 liter

Mot soppsykdommer i eple og pære.

Sammensetning:
 Fluopyram 500 g/l
 Spred-, klebe- og fyllstoffer..... 720 g/l



Giftig med langtidsvirkning, for liv i vann.
 Kan forårsake grunnvannsforurensning.
 Oppbevares innelåst.
 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene).
 Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



NO79978308A

REG. NR. 2015.51
AVGIFTSKLASSE:3

Behandlingsfrist:
Eple og pære:14 dager

Reg. nr.: 2015.51

UN 3082



5 705628 280081

Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importer:
Bayer AS
Bayer CropScience
Postboks 193
1325 Lysaker
Tlf. 91 14 71 60

Bayer

| | | |
|-----------------------|--|---|
| RIFMO | PMR: NO79978308A Bayer CropScience DK | |
| | Form.: 297x150 mm | Date: 05-01-2016 |
| | Artwork: 4942D | Country: NO |
| Job no.: 36-4390/2190 | Colour: CMYK | <input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections <input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server |