



GIBB PLUS FOREST

Blomstringsstimulering i frøplantasjer med bartre

Registreringsnummer 2016.19

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktigheitsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Forsiktigheitsregler

Bruk vernehandsker, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved ohell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22591000

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

For blomstringsstimulering i frøplantasjer med bartre. Plantingene er ment for produksjon av frø.

Brukerveiledning

Gibb Plus skal brukes i konsentrert form (ikke fortynnet) og anvendes ved at midlet dryppes /sprøytes i flere hull som bores i stammen. Plasser hullene på ulike høyder men innenfor passende arbeidshøyde. Hullene skal ikke plasseres loddrett over hverandre. For å minne antall hull pr. stamme kan man velge å sprøyte inn midlet ved to forskjellige anledninger. I slike tilfeller skal den andre sprøytingen gjøres før midlet fra den første er totalt absorbert i veden.

Hullene bores 2-3 cm dype på skrå nedover med en hulldiameter på 8-12 mm avhengig av hvor grov stammen er. Midlet håndteres i sprøyte som gir nøyaktig dosering. For korrekt dosering gjøres prøvesprøyting i måleglass før oppstart av behandling og regelmessig i løpet av arbeidet.

Dosering grantre:

Diameter på tre	Gibb Plus Forest ml
7-15 cm	2
15-20	4
20-25	6
25+	10

Furutre behandles med dobbel dose

Behandlingstidspunkt

Når grenenes årsskudd er ca. 2/3 av sin endelige lengde. Det forekommer i slutten av juni til begynnelsen av juli avhengig av hvor i landet behandlingen finner sted.

Lagring: Oppbevares i temperatur som ikke er under 0 grader C og over 25 grader C og på en sikker plass. Oppbevar kun i originalemballasjen som skal være godt lukket.

Rengjøring: Rengjør utstyr godt. Godt

rengjort brukt emballasje kan leveres på gjenbruksstasjon.

Miljøhensyn: Pass på at produktet eller tomemballasjen ikke kommer ut i vassdrag eller i grøfter.

Lagringstid/Holdbarhet: Dette produktet skal brukes innen 10 måneder fra produksjonsdato, som vises på etiketten.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Innhold: 9,6 g/kg (0,96% w/w) av en blanding av Gibberellinsyra A4 og A7

Registreringsinnehaver:



Globachem

Globachem NV, Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden,
Belgia

Importør/markedsfører av:

Stiftelsen Det Norske Skogførererk, P.O. box 118,
2301 Hamar, Norge

Innhold: 1L

