



GIBB 3



VEKSTREGULERENDE MIDDEL

▶ **Vekstregulerende middel til utsettelse av modning av søtkirsebær.**

▶ **Gibberlinsyre (GA3) 1 g per tablett (10%)**

▶ **Tabletter**

▶ **Behandlingsfrist: 3 uker**

▶ **REG.NR. 2016.23 / Avgiftsklasse 1**

Importør:
Felleskjøpet Agri SA
Depotgata 22
2000 Lillestrøm
Tlf.: 03520

Tilvirker
Globachem NV,
BE-3800 Sint-Truiden,
Belgia



Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

GIBB er tillatt brukt til utsettelse av modning i søtkirsebær.

BEHANDLINGSFRIST

3 uker

VIKEMÅTE

GIBB 3 inneholder et naturlig forekommende plantehormon (gibberelinsyre). Gibbereliner påvirker generelt celledeling og cellevekst i planter, men har også påvirkning på modningsprosesser og fruktsetting med mer.

VIKEOMRÅDE

Gibb 3 brukes for å få fastere, søtere og større moreller med utsatt moding og bedre holbarhet. Bruk av gibberlinsyre kan også medføre avvikende fargeutvikling på frukten, samt påvirke fruktsetting/avling og vegetativ vekst året etter.

OPPBEVARES INNELÅST / OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN / BRUK EGNET VERNEUTSTYR (SE FORSIKTIGHETSREGLER) / USKADELIGJØR TOMEMBALLASJEN (SE AVFALLSHÅNDTERING)



VEKSTREGULERENDE MIDDEL



Nettoinnhold:
10 tabletter (100 g)



ET10.156/V05



NO

BRUKSRETTLEDNING

Forholdet til varemottaker:

Generelt anbefalet at evt. Behandling med GIBB 3 skjer i samråd med den som skal kjøpe søtkirsebærene.

Behandlingstidspunkt:

GIBB 3 – behandling utføres når søtkirsebærene skifter farge fra grønt til gult (strågule). 1 behandling per sesong. Effekten avtar ved sprøyting nærmere mot høsting. Unngå behandling på stressede trær eller under ekstreme temperatur, tørke eller andre unormale omstendigheter.

Dosering:

Bruk 3 tabletter og minimum 50 l væskemengde per daa ved tåkesprøyting i tettplantinger med trehøyde 2,5 – 3 m og kronediameter 2 m . Dette svarer til 2 tabletter per 100 l vann ved riflesprøyting. Bruk væskefølsomt papir til kontroll for å sikre god dekning. Ved tåkesprøyting bør en ikke konsentrere væskemengden mer enn 3 ganger.

TILLAGNING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll sprøytetanken med aktuell vannmengde, og tilsett riktig antall tabletter. Omrøring skal være i gang under utblanding av sprøytevæska og under selve sprøytearbeidet.

Det er viktig å påse at tablettene er fullstendig oppløst før utkjøring tar til. Normalt tar dette ca. 15 minutter. Tillaget løsning er ikke stabil, og må derfor brukes med en gang etter utblanding.

BLANDING

Kan blandest med vanlige sopp- og insektmiddel som er godkjente i frukt, og dessuten næringssalt til bladsprøyting.

GENERELLE FORHÅNDSREGLER

Da det kan være variasjon i kulturplantenes reaksjon på behandlingen, og det også kan være stor variasjon i forholdene ved behandlingstidspunktet, anbefales generelt at bruk av GIBB 3 skjer i samråd med veileder som kjenner produktet.

FORSIKTIGHETSREGLER

Vask hender og ansikt når arbeidet avbrytes eller er ferdig.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken.

Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurenning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat forsprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING


Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallssanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Oppbevares tørt og frostfritt i lukket emballasje. Må ikke utsettes for temperatur over 32° C.

MERK

Leverandøren garanterer at produktet holder rett kvalitet Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksrettledningen er basert på forskning og erfaring. Erfaringen fra bruk under norske forhold, og på alle tilgjengelige sorter er begrenset. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skade på kulturen, utilsiktelig/utslisikket effekt, eller andre forhold som oppstår ved bruk av preparatet.



GIBB 3



VEKSTREGULERENDE MIDDEL

- ▶ **Vekstregulerende middel til utsettelse av modning av søtkirsebær.**
- ▶ **Gibberlinsyre (GA3) 1 g per tablett (10%)**
- ▶ Tabletter
- ▶ Behandlingsfrist: 3 uker
- ▶ REG.NR. 2016.23
Avgiftsklasse 1

Oppbevares innelåst
Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

Importør:
Felleskjøpet Agri SA
Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Tlf : 03520

Tilvirker
Globachem NV.
BE-3800 Sint-Truiden,
Belgia



GENERELLE FORHÅNDSREGLER

Da det kan være variasjon i kulturplantenes reaksjon på behandlingen, og det også kan være stor variasjon i forholdene ved behandlingstidspunktet, anbefales generelt at bruk av GIBB 3 skjer i samråd med veileder som kjenner produktet.

FORSIKTIGHETSREGLER

Vask hender og ansikt når arbeidet avbrytes eller er ferdig.
Ved langvarig sprøyting og når det er fare for sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøyte-tanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallssanlegg.
Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Oppbevares tørt og frostfritt i lukket emballasje. Må ikke utsettes for temperatur over 32° C.

Nettoinnhold:
50X 10 tabletter (100 g)



ET12820V05

