

# Aphidoline

**Bladlusgallmygg** (*Aphidoletes aphidimyza*)

**Bruksformål:** Mot bladlus på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

**Sammensetning:** Pupper av bladlusgallmygg blandet med vermikulitt.

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.**

**Unngå innånding av støv.**

**Unngå hudkontakt**

**Tilvirker:** Syngenta Bioline Agrosience Ltd. Telstar Nursery Holland Road,  
Little Clacton Essex CO16 9QG, England

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. Nr.** 2018.20

**Nettoinnhold:** se forpakning

**Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

**Bruksområde:**

Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

**Virkeområde:**

Angriper de fleste bladlusarter på overjordiske plantedeler. Anbefales spesielt når det har blitt kolonier med bladlus (kan også spise mellus, rovmidd eller andre små byttedyr hvis det ikke er nok bladlus).

**Virkemåte:**

Voksne gallmygg er aktive i mørket og blir tiltrukket av lusekolonier pga. lukten fra honningdugg. Egg blir lagt i lusekoloniene, og gallmygglarvene lammer bladlusene og suger ut kroppsvæsken. Drepte bladlus vil henge igjen på bladene ved hjelp av munndelene. Lusene skrumper inn, blir brune og svarte og går i oppløsning.

**Utseende:**

Voksne gallmygg: 2,5 mm, spinkle gråsvarte mygg med lange bein

Egg: Avlange, 0,1 x 0,3 mm, skinnende rød-oransje.

Larver: Opptil 3,0 mm lange, gule, røde eller brun-grålige, uten hode og bein. De finnes helst i bladluskolonier.

Puppe: 2 mm lang, i en kokong i vekstmediet, dekket med torv, sand eller jordpartikler.

**Klimakrav:**

Foretrekker høy luftfuktighet. Larvene må ha minst 15,5 timers lys for å unngå at de går i diapause i puppestadiet.

Voksne er nattaktive og krever skumring/mørke for parring og egglegging. Natttemperaturen må være over 16°C.

**Bruksrettledning:**

Åpne flasken i drivhuset. Plasser flasken på bakken eller heng den opp i mellom plantene (for å beskytte den mot maur). Flasken må skjermes for sola, ettersom det blir veldig varmt i en flaske som står i solskinn, og da dør gallmyggen. Etter klekking vil gallmyggen fordele seg i anlegget.

	Antall dyr/m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 1000 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	-	-	-	-
Lett bekjempelse	1	1000	Hver uke	3 x
Kraftig bekjempelse	10	100	Hver uke	3 x

**Integrert plantevern:**

*A. aphidimyza* er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list» på produsentens nettsider). Den kan også brukes samtidig med de fleste andre nytteorganismer.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres maks 1-2 dager ved 10-15°C i mørket.

**Forsiktighetsregler:**

Ingen.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):**

Se forpakningen.