

# Nutrimac

Steriliserte sommerfuglegg av voksmøll (*Ephestia kuehniella*)

**Bruksformål:** Eggene er en alternativ proteinkilde for rovtogene *Macrolophus pygmaeus* og *Orius majusculus*.

**Sammensetning:** 10 gram med egg av *Ephestia kuehniella* blandet med ris.

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.**

**Unngå innånding av støv.**

**Unngå hudkontakt.**

**Tilvirker:** Biobest N.V., Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgia

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. Nr.:** 2018.79

**Nettoinnhold:** se forpakning

---

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

---

**Bruksområde:**

Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

**Virkeområde:**

Sterile sommerfuglegg av *E. kuehniella* er svært proteinrike og kan brukes til oppformering av rovtogene *M. pygmaeus* og *O. majusculus*. Rovtege-populasjonen kan dermed holde seg stabil i perioder med lite skadedyr. På denne måten kan man unngå oppblomstring av for eksempel mellus, trips, spinnmidd og bladlus som følge av svingninger i rovtége-populasjonen.

**Virkemåte:**

Rovtegene spiser eggene når det er liten tilgang på annen føde i kulturen.

**Utseende:**

Egg: Gule og avlange, ca. 0,6 mm lange.

**Klimakrav:**

Ingen spesielle klimakrav, men eggene kan tørke ut ved direkte solskinn.

**Bruksrettleiding:**

Introduser *Ephestia*-eggene samtidig med *M. pygmaeus* og/ eller *O. majusculus* annenhver uke inntil første mellus, trips, spinnmidd eller bladlus observeres i kulturen. Sprut vann på bladene før man drysser på eggene. Fordel eggene på de samme utslippsstedene som rovtogene (5-10 introduksjonspunkt pr. 1000 m<sup>2</sup>). Introduser eggene på midten av plantene, slik at de ikke tørker ut av sola eller blir plukket av plantene. Merk området hvor eggene introduseres.

	Antall/ m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 10 g	Intervall	Antall behandlinger
<i>Forebyggende</i>	<i>0,01 gram</i>	<i>1000</i>	<i>Hver uke</i>	<i>Minst 3 x</i>

**Integrert plantevern:**

Ettersom egg av *E. kuehniella* er sterile (drept ved frysing eller stråling) vil de ikke påvirkes av kjemiske sprøytemidler. Problemer kan oppstå dersom nytteorganismer spiser egg med sprøytemiddelbelegg.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart ved ankomst. Kan lagres maks 5 dager ved 8-10 °C i mørket.

**Forsiktighetsregler:**

Ingen.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):**

Se forpakning.