



# Broadway™ Star

## UGRASMIDDEL

UFI: 03S3-MOV1-D00T-XS78

**Mot ugras i vårhete**

### Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P261 Unngå innånding av støv/aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P411 Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn 30°.

Inneholder pyrokssulam og klokvintocet-meksyl.

Kan gi en allergisk reaksjon.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.

Spe3 For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 5 meter fra overflatevann.



### Formulering:

Vannløselig granulat

**AVGIFTSKLASSE: 1**

### Sammensetning:

Pyrokssulam 70,8 g/kg

Florasulam 14,2 g/kg

**Reg. Nr. :** 2018.82

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.

**Tilvirker:** Corteva Agriscience

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København K - Danmark

### Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520

Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700

Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

**NETTOINNHOLD: 1,06 KG**

™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

K-60624/0990794112207

BASE LABEL

BASE LABEL

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

Det er viktig å merke seg at vurderingen av preparatets risiko for helse og miljø er utført på preparatet alene, og ikke som en blanding med andre preparater.

### Bruksområde

Broadway Star kan brukes i alle sorter av vårhvete for bekjempelse av ugras.

Må ikke brukes korn med gjenlegg av gras eller belgvekster (kløver etc.).

### Virkemåte

Broadway Star tas i hovedsak opp gjennom bladene.

Den har bred ugrasvirkning inkludert virkning mot kveke, åkerkvein, floghavre, åkerstemorsblom, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, spillfrø av oljevekster, gjetertaske, åkersennep, vassarve mfl. Veksten i sensitive ugrass vil stoppe umiddelbart etter absorpsjon i bladene og visuelle symptomer vil oppstå noen uker etter behandling.

Sprøyt ikke en stresset åker. Stress kan forårsakes av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel, sjukdommer og insektsangrep. Etter behandling av Broadway Star kan kornplanten få en forbigående gulning.

### Resistens forebygging

Produkt	Type	Aktivt stoff	HRAC gruppe	Risiko for resistens
Broadway Star	HERBICID	Pyrokssulam Florasulam	B	Høy

Broadway Star inneholder pyrokssulam og florasulam som begge tilhører triazolpyrimidin (gruppe B, HRAC klassifisering) og er en ALS-hemmer.

Resistens mot ALS-hemmere (sulfonylurea) er kjent hos tilfeller av vassarve, samt enkeltstående tilfelle i balderbrå, då, linbendel, stivdylle og hønsegras i Norge.

Det er en stor risiko for utvikling av resistens til disse aktive stoffene så forholdsregler bør tas for å minimere risikoen.

Unngå å bruke ugrasmidler med en virkemekanisme som for eksempel ALS ugrasmidler i samme felt over flere år. Bruk ikke Broadway Star alene i mer enn 2 av 3 år. Det tredje året må det brukes / skiftes til et middel fra en kjemisk gruppe med en annen virkningsmekanisme, tankblandes med dette eller kombineres med et ikke-kjemisk tiltak. Når ALS-resistente ugrasarter er observert på feltet bør Broadway Star ikke brukes alene, men i blanding med eller skiftes til et herbicid med en annen virkemekanisme for å bekjempe ALS resistent ugrasarter. Vurder også om bruk av kulturelle kontrollmetoder er mulig.

### Bruksretledning

#### Vårhvete

Broadway Star kan brukes fra BBCH 23–32 med opp til 15 g/daa.

Dosering, g/daa	Ugras og forventet effekt		
	95-100%	85-94%	70-84%
15 + PG26N	Vassarve, Pengeurt, Åkersennep, Gjetertaske, Floghavre	Klengemaure, rødtvetann, balderbrå, vindeslirekne, åkerstemorsblom	Kveke, tunrapp

### Klebmiddel

Broadway Star skal blandes med klebemiddelet PG26N (50 ml/daa) for å oppfylle deklartert virkeområde.

### Blandinger

Broadway Star er ikke vurdert i blanding med andre plantevernmidler. Broadway Star kan ikke blandes med

produkter som inneholder fenoksaprop eller vekstregulerende midler som inneholder trineksapaketyl eller etefon. Det anbefales et 7 dagers intervall mellom behandlingene.

### Jordtyper

Broadway Star kan brukes på alle jordtyper.

### Værforhold

Broadway Star kan brukes fra 6°C. Unngå behandling under svært varme eller tørre forhold og før frost.

### Regnfasthet

Broadway Star er regnfast en time etter behandling.

### Omsåning

Korn, mais og gras kan etableres 6 uker etter pløying eller grundig harving.

### Etterfølgende kultur

Enhver etterfølgende kultur kan etableres etter høsting av en behandlet kulturvekst.

### Nabokulturer

Unngå avdrift til følsomme nabokulturer.

### Påfylling

Broadway Star kan sprøytes ut med konvensjonell åkersprøyte. Preparatet kan fylles på direkte i tanken eller gjennom preparatpåfylleren. Hell i din ønskede mengde av Broadway Star i halvfull sprøyte med rent vann, sett på omrøring og hell deretter i ønsket mengde vann. Omrøring skal være på under hele sprøytearbeidet.

### Vannmengder

Ved bruk av standard eller såkalt low drift dyse er den anbefalte doseringen 10-30 l vann/daa. Den minste vannmengden skal bare brukes i åpne kulturer med smått ugras. Ved sen behandling når kornet er høyere skal vannmengden økes til 20-30 l/daa. Minste anbefalt trykk er 2-3 bar.

### Rengjøring

#### Merk! Eventuell

skyllevannstank bør være av en størrelse slik at sprøytevæsken tynnes ut 5 ganger. Det er spesielt viktig å rengjøre alle innvendige deler.

Aktiver alle slanger og ventiler samt øk trykket slik at overtrykkssventil i det selvrensede filteret løses ut.

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen.

Deretter vaskes tanken innvendig med vann tilsatt All Clear<sup>1</sup> Extra. Bruk en vannmengde tilsvarende minst 10 % av tankvolumet. Start omrøring og sprøyt litt gjennom dysene. La resten stå i systemet minst 30 minutter. Start omrøring igjen og sprøyt alt vaskevannet ut gjennom dysene. Gjør dette minst 3-5 ganger. Siler og dyser skal tas ut og rengjøres spesielt godt med 50 ml All Clear Extra /10 liter vann

Skyll sprøyteutstyret med vann i 5 minutter og sprøy ut gjennom dyser og slanger på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med anbefalt vaskemiddel som All Clear Extra.

### Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker (av nitril/ neopren) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/ sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/ P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

### Lagring

Lagres tørt og frostfritt, ved temperaturer under 30°C, i lukket originalemballasje.

### **Avfallshåndtering**

Grundig rengjort tomemballasjebringes til lovlig avfallsanlegg.  
Konsentrerte rester av plantevernmidler og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

<sup>1</sup>Varemærke – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**



# Broadway™ Star

## UGRASMIDDEL

UFI: 03S3-MOV1-D00T-XS78

**Mot ugras i vårhete**

### Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P261 Unngå innånding av støv/aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P411 Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn 30°.

Inneholder pyrokssulam og klokvintocet-meksyl.

Kan gi en allergisk reaksjon.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.

Spe3 For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 5 meter fra overflatevann.



### Formulering:

Vannløselig granulat

**AVGIFTSKLASSE: 1**

### Sammensetning:

Pyrokssulam 70,8 g/kg

Florasulam 14,2 g/kg

**Reg. Nr. :** 2018.82

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.

**Tilvirker:** Corteva Agriscience

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København K - Danmark

### Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520

Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700

Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

**NETTOINNHOOLD: 1,06 KG**

TM © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

BASE LABEL

BASE LABEL