

dazide ENHANCE®

UFI: E2N6-H06N-300C-8DH0

DAMINOZID 85% VANNOPPLØSELIG GRANULAT

VEKSTREGULERING AV PRYDPLANTER I
VEKSTHUS

SAMMENSETNING: DAMINOZID85%
FILLSTOFFER 15%

REGISTRERINGSNUMMER: 2019.23.23

AVGIFTSKLASSE 2

ADVARSEL



Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/ungå forurensning via avrenning fra gårds plasser og veier.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.

fine

TILVIKNER:
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
HILL END HOUSE WHITTINGTON
WORCESTER WR5 2RQ, UK
E: ENQUIRE@FINE.EU
WWW.FINE.EU
TEL: +44 (0) 1905 361800,
FAXS: +44 (0) 1905 361810


Nordisk Alkali
Localised Total Care

**REPRESENTANT
I NORGE:**
NORDISK ALKALI
ANEMONEVÆNGEN 2
DK-4330 HVALSØ
+45 4649 1171

NETTINNHOLD:
1 KG

BRUKSOMRÅDE

Dazide Enhance er tillatt brukt til vekstregulering av prydplanter og sommerblomster i veksthus. Aktuelle prydplanter er blant annet *Aster*, *Azalea*, *Brassica*, *Cosmos*, *Dicentra*, *Lobelia*, *Nemesia*, *Phlox*, *Salvia*, *Tagetes*, *Viola*, *Zinnia*, *Kalanchoe*, *Hydrangea*, *Petunia*, *Calibrachoa*, *Helianthus* og *Chrysanthemum*.

VIRKEOMRÅDE

Dazide Enhance hemmer strekningsveksten og gir plantene en kompakt vekstform.

BRUKSRETTLEDNING

Dosering og bruk:

Per behandling: 0,06-0,6% (60-600 g per 100 liter vann)

Maks dose per behandling og areal: 600 g/daa

Maks antall behandlinger per dyrkningshold og år: 5

Maks dose per dyrkningshold og år: 3000 g/daa

Minimumsintervall mellom behandlinger: 7 dager

Siste vekststadium hvor behandling er tillatt: når 40% av blomstene er åpne (BBCH 64)

Dosering og antall behandlinger avhenger av ulike faktorer, som for eksempel plantevekst og dyrkningsforhold.

Ved tilberedning av sprøytevæsken fyll først halvparten av tanken med vann før tilsetning av produktet for å forhindre overdreven skumdannelse.

Veksthusplanter	Dose pr. behandling * (g/ 100 l vann)	Væskemengde (l/daa)	Antall behandlinger	Interval mellom behandlingar (dager)	Behandlingstid	Tilleggsinformasjon
Prydplanter, generelt**	100- 600	150	1-5	7	Når 40 % av blomstene er åpne (BBCH 64)	
Ildtopp (Kalanchoe)	100- 300	150	1-3	7	Før blomsterknoppstadiet	Blomstringen kan bli forsinket. Begrenset bladskade kan forekomme i følgende sorter ved lite lys og/eller lav temperatur.
Hortensia (Hydrangia macrophylla)	400	150	1-3	7	Når ny skuddvekst er 1- 2 cm	Påfør første spray senest 4 uker etter starten av knoppsprett.
Petunia og Calibrachoa	400- 600	150	1-5	7	Avhengig av plantesort og vekstforhold	

Veksthusplanter	Dose pr. behandling * (g/ 100 l vann)	Væskemengde (l/daa)	Antall behandlinger	Interval mellom behandlinger (dager)	Behandlingstid	Tilleggsinformasjon
Solsikker (<i>Helianthus annuus</i>)	400	150	1-3	14	Avhengig av plantesor og vekstforhold	Til bruk på potte- solsikker dyrket som snittblomst i veksthus.
Krysantemum, potteplanter	200-500	100	1-2	7-10	Når ny skuddvekst er 2 cm	Dosen er avhengig av kulturen; Påfør høy dose for sterkt voksende sorter. Behandlingen må gjentas etter 7 til 10 dager.
Krysantemum, snitt, enkle/ rasktvoksende	500	100	1-3	7-10	Avhengig av plantesor og vekstforhold	For å hemme veksten, bør produktet brukes i en tidsplan av 1 til 3 behandlinger per kultur, med et intervall på 7 til 10 dager mellom behandlingene.
Krysantemum, snitt, fylte***	1) 60 2) 100 3) 200	100	1-3	21	1) 1 uke etter utsettelse 2) 1 uke etter første beh. 3) Synlige blomsterknopper	

* Anbefalingene bør ikke endres, men reduksjon av dosen er tillatt.

** Eksempel: Aster, Azalea, Brassica, Cosmos, Dicentra, Lobelia, Nemesia, Phlox, Salvia, Tagetes, Viola og Zinnia

*** Eksempel: Sortene 'Skolem' og 'Rivalry'

FORSIKTIGHETSREGLER

Benytt vernehansker av nitrilgummi og overtreksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

HÅNDBTERINGSFRIST

Vernehansker, heldekkende arbeidstøy og støvler må benyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting. Hansker må benyttes ved håndtering av plantedeler i 14 dager etter behandling.

TANKBLANDINGER

Det anbefales ikke å blande Dazide Enhance med andre preparater eller kjemikalier.

Det er viktig å merke seg at vurdering av preparatets kjemiske- og fysiske egenskaper, samt effektivitet og risiko for fysiske farer, helse og miljø er utført på preparatet alene, og ikke som en blanding med andre plantevernmidler.

RENGJØRING

Tom emballasje skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til anbefalinger. Skyll sprøyteutstyr med vann etter avsluttet sprøyting, på et sted hvor preparatresten og vaskevann ikke medfører fare for forurensning.

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plantevemiddel og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Må lagres tørt og ved romtemperatur.

HOLDBARHET

Minst 2 år i uåpnet emballasje fra produksjonsdatoen.

BETINGELSER FOR PRODUKTGARANTI OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Fine Agrochemicals Ltd ("FINE") garanterer at dette produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene som er angitt på denne etiketten. Fine fraskriver seg alle andre garantier, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.

Det er umulig å eliminere alle risikoene forbundet med dette produktet. Plantefeil, manglende ytelse eller andre utilsiktede konsekvenser kan oppstå på grunn av faktorer som tilstedeværelse av andre materialer, bruksmåte, bruk av produktet annet enn i samsvar med denne etikettens instruksjonsetikett eller andre faktorer, som alle er utenfor kontrollen av Fine eller selgeren. I den utstrekning som er i samsvar med gjeldende lov, skal alle slike risikoer antas av kjøperen.

Fines ansvar under denne etiketten skal være begrenset til kjøpesummen eller, ved valg av Fine, den frie utskiftningen av produktet. Fine frasier seg ethvert ansvar for spesielle, tilfældige eller følgeskader som skyldes håndtering eller bruk av dette produktet.

dazide ENHANCE®

UFI: E2N6-H06N-300C-8DH0

DAMINOZID 85% VANNOPPLØSELIG GRANULAT

VEKSTREGULERING AV PRYDPLANTER I
VEKSTHUS

SAMMENSETNING: DAMINOZID 85%
FYLSTOFFER 15%

REGISTRERINGSNUMMER: 2019.23.23

AVGIFTSKLASSE 2

ADVARSEL



Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/ungå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.

Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.

fine

TILVIRKER:
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
HILL END HOUSE WHITTINGTON
WORCESTER WR5 2RQ, UK
E: ENQUIRE@FINE.EU
WWW.FINE.EU
TEL: +44 (0) 1905 361800,
FAKS: +44 (0) 1905 361810



**REPRESENTANT
I NORGE:**
NORDISK ALKALI
ANEMONEVÆNET 2
DK-4330 HVALSØ
+45 4649 1171

NETTINNHOOLD:
1 KG

