



UN 3077



Tilvirker:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Importør:
Bayer AS
Postboks 193
N-1325 Lysaker
Tlf. 91 14 71 60

Bayer

LITO TRYK	PMR: NO85397702B	Bayer CropScience DK	
Form.: 297x150 mm	Date: 12-02-2020	<input type="checkbox"/> Use only for corrections	

Artwork: 4942e
Job no.:

Country: NO
Colour: CMYK

Print Ready PDF for
upload to Server

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Attribut® SG 70 i strid med godkjent bruksområde, behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Attribut SG 70 er tillatt brukt mot ugras i høst- og vårvete.

MÅ ALLTID BENYTTERES SAMMEN MED HUSSAR OD!

VIRKEOMRÅDE

Attribut SG 70 er et ugrasmiddel med god virkning mot ulike faks-arter, hønsehirse, kveke, åkerkvein, knereverumpe samt noen tofrøblada ugrasarter. Tabellen under viser effekt av Attribut SG 70 alene. Mot flere av artene blir det bedre effekt ved å blande med Hussar OD.

Kultur	Tidspunkt (BBCH)	Dose g per dekar	Ugrasart
Vårvete	13-32	6	Svært god effekt: floghavre, gjeter-taske, åkersennep, pengeurt, balderbrå, tungras God effekt: kveke Moderat effekt: hønsehirse*
Høsthvete	20-29	5,3	God effekt: kveke, åkerfaks, då, tungras, åkerkvein**, knereverumpe Moderat effekt: balderbrå
Høsthvete	30-32	6	Svært god effekt: rugfaks God effekt: kveke, knereverumpe, åkerkvein**, raps, åkerfaks, gjeter-taske, då, tungras, åkersennep Moderat effekt: klengemaure, balderbrå

* Ved bekjempelse av hønsehirse, MÅ behandling skje senest ved 2-bladstadiet av hønsehirse for å få en god virkning av Attribut SG 70.

** For å få denne gode effekten på åkerkvein, MÅ Attribut SG 70 blandes med Hussar OD.

Rangering av mottakelighet hos ugras (SANCO/10055/2013)	Effekt
Svært god effekt	95.0-100.0%
God effekt	85.0-94.9%
Moderat effekt	70.0-84.9%

VIRKEMÅTE

Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Produktet tilhører gruppen av virksomme stoff som kalles ALS-hemmere HRAC-gruppe B. Optaket skjer både gjennom jorda og via bladene.

Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10 - 15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker.

Ved bekjempelse av hønsehirse, MÅ behandling skje senest ved 2- bladstadiet av hønsehirse for å få en god nok virkning av Attribut SG 70.

RESISTENS

Attribut SG 70 tilhører den kjemiske gruppen ALS-hemmere, HRAC gruppe B. Resistens mot Attribut SG 70 er ikke kjent hos ugras i Norge, men resistens mot andre ALS-hemmere er godt kjent. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/ middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling, skal preparat maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre. Ved behov for ytterligere behandlinger må det brukes et middel fra en annen middelgruppe før ny behandling med Attribut SG 70.

KLIMAETS PÅVIRKNING

Værforhold

Attribut SG 70 virker både gjennom optak via blader og røtter. Det anbefales derfor at man behandler når det er god jordfuktighet som øker optaket gjennom røttene.

Ugras og kulturplanter må være i god vekst ved behandling med Attribut, men produktet er ikke følsomt for temperatur ved behandling. Se ellers blandingspartner.

Jordfuktighet og jordtype

Opp tak via røtter vil påvirkes gjennom graden av jordfuktighet på behandlingstids punktet. På jorder med høyt innhold av leire eller moldjord kan man forvente noe lavere opp tak via røttene.

BRUKSRETTLEDNING

Attribut SG 70 SKAL alltid benyttes i blanding med Hussar OD. Husk alltid tilsetning av penetreringsoljen Mero. Se produktenes etikett, samt avsnitt om blandingspartnerne. Ved torre jordforhold kan man ikke forvente noe opp tak av Attribut via røttene, og dette kan gi noe dårligere virkning av produktet.

Dersom man skal ha virkning av produktet må ugraset og kulturen være i god vekst og temperaturen bør derfor være over 5 °C.

Attribut SG 70 skal alltid tilsettes penetreringsoljen Mero. Bruk 50 ml Mero per daa.

Bruk 15 - 30 l vann per daa!

Antall behandlinger/ Maksimal dosering per år

Kultur	Maks. antall behandlinger	Maksimal dose per år
Høsthvete	1	6 g/ daa
Vårhvete	1	6 g/ daa

Høst- og vårhvete

Ved bekjempelse av hønsehirse, MÅ behandling skje senest ved 2- bladstadiet av hønsehirse for å få en god nok virkning av Attribut SG 70.

Vær oppmerksom på at enkelte sorter av vårhvete kan være mer følsomme overfor dette produktet (gulfarging), og stresset åker kan i enkelte tilfelle settes noe tilbake i utvikling. Se også avsnittene *Produktbegrensninger* og *Blandbarhet*.

I blanding med Hussar OD:

Sprøyt om våren så snart ugraset har begynt å vokse (fra kornets 2- bladstadium eller Zadoks 13 på kulturen), og før ugraset har mer enn 4 varige blad (fram til Zadoks 32 på kulturen). Dersom ugraset er blitt for stort, får man redusert effekt. Bruk 6 g Attribut SG 70 + 5 ml Hussar OD + 50 ml Mero per daa. Hussar OD tilsettes for å sikre selektiviteten, og samtidig økes virkningsspekteret.

Dersom man velger å redusere dosen, skal forholdet Attribut og Hussar holdes på samme nivå (6:5).

I blanding med Hussar OD og med full dose (6 g per dekar) er Attribut SG 70 effektiv mot en rekke grasugras og tofrøblada ugrasarter.

ETTERFØLGENDE KULTUR/ OMSÅING

Attribut SG 70 brytes hurtig ned i jorda, og derfor kan det året etter dyrkes alle vanlige åkerkulturer. Høstraps frarådes det imidlertid å så samme år som man har brukt Attribut.

Ventetid for etterfølgende kultur

120 dager for bladgrønsaker, fruktbarende grønnsaker og rot- og knollvekster.

Se også blandingspartnerne.

PRODUKTBEGRENSNINGER**Generelt**

Attribut SG 70 skal brukes om våren i hvete. Produktet kan gi kulturen en forbigående gulfarging og påvirke stråstrykken. Disse sidevirkningene reduseres ved å tilsette Hussar OD. Attribut SG 70 skal derfor ALLTID BLANDES MED HUSSAR OD.

Symptomer

Det skal ikke benyttes Attribut SG 70 på en kultur som av en eller annen årsak er stresset. Vi tilrår derfor ikke å bruke Attribut SG 70 under følgende forhold:

- Når kulturplantene av en eller annen grunn sliter og er stresset (tørke, næringsmangel, vannmetning etter mye nedbør etc.)
- Dårlig jordstruktur/ vassjuk jord.
- Svak rotutvikling på kulturplantene.
- Fare for nattefrost etter behandling.

NB! Blanding med andre midler kan forsterke overnevnte symptomer.

BLANDINGSPARTNERE

Attribut SG 70 må blandes med Hussar OD og Mero for å oppfylle deklareret virkeområde. Følg bruksanvisningen.

Ved blanding med mangansulfat BØR det maksimalt brukes 2 kg/ 100 liter vann, og det SKAL IKKE blandes med Mero eller andre penetreringsoljer.

SPRØYTETKNISKE FORHOLD/ VALG AV DYSER

Lav framdriftshastighet og fin forstøvning er viktig for å sikre god dekning av grasugraset.

LowDrift dyse med medium forstøvning kan være et alternativ, hvis man ved dette kan få sprøytet ved det korrekte sprøytetidspunktet. NB! Husk å unngå avdrift til andre kulturer da mange kulturer er følsomme overfor Attribut SG 70.

Fin forstøvning

Dyse	Trykk	Hastighet	Vannmengde
ISO 110-020 (gul)	2,6 bar	6 km/t	15 l/ daa

Medium forstøvning

Dyse	Trykk	Hastighet	Vannmengde
ISO 110-030 (blå)	2,8 bar	7, km/t	20 l/ daa

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll tanken halvfull med rent vann. Tilsett tilmålt mengde med Attribut SG 70 først. Ryst flasken med Hussar OD godt før tilmålt mengde tilsettes. Start omrøring. Fyll tanken med den resterende vannmengde og tilsett penetreringsoljen Mero til slutt. Sørg for god omrøring før og under sprøytingen.

LAGRING

Lagres tørt og frostfritt i lukket originalemballasje. Minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato i våpena beholder.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/neopren av god kvalitet og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøyteåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller
Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).**

RISIKOREDUSERENDE TILTAK

Kultur	Tidspunkt og vekststadie (BBCH)	Dose (g produkt/daa)	Riskoreduserende tiltak
Høsthvete	Sprøytes om våren BBCH 20-29	5,3	10 m vegetert buffersone (inkl. 10 m avstandskrav til overflatevann)
Høsthvete	Sprøytes om våren BBCH 30-32	6,0	10 m vegetert buffersone (inkl. 10 m avstandskrav til overflatevann)
Vårhvete	Sprøytes om våren BBCH 13-32	6,0	5 m avstandskrav til overflatevann

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal være anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gress eller gress og urter.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytebunken. Rester fra sprøytebunken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.

Deretter vaskes tanken innvendig med vann tilsatt vaskemiddel, f.eks. Salmi, Ozon salmiakk, Ozon kompakt krystalsoda i 1 % styrke eller All Clear Extra. Bruk en vannmengde tilsvarende minst 10 % av tankvolumet. Start omrøring og sprøytt litt gjennom dysene. La resten stå i systemet minst 30 minutter. Start omrøring igjen og sprøytt alt vaskevannet ut gjennom dysene. Gjør dette minst 2 ganger. Siler og dyser bør tas ut og rengjøres spesielt godt.

Skyll sprøyteutstyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plantevernmiddel og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Resultatet av bruken av produktet vil alltid være påvirket av en rekke biologiske og fysiske forhold, og det vil derfor være naturlige variasjoner i resultat. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Dersom preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller mangelfull virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group

Tilvirker:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Importør:
Bayer AS
Postboks 193
N-1325 Lysaker
Tlf. 91 14 71 60



Bayer



UN 3077

5 705628 323412

Tilvirker:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Importør:
Bayer AS
Postboks 193
N-1325 Lysaker
Tlf. 91 14 71 60

Bayer