

# Matrigon™ 600 SL

## UGRASMIDDEL

### Klopyralid vannløselig konsentrat

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, vår- og høsthvete, vår- og høstbygg, formargål, hodekål, mais  
(gjelder ikke sukkermais), forbete, sukkerbete, skogplanting på innmark, planteskoler, eng, beite og grasfrøeng. Kløver/belgvekster skades.

### Sammensetning:

Klopyralid (som dimetylammoniumsalt) 600 g/l

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktigheitsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nært overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsninger og veier.

Spe 1For å beskytte grunnvannet må dette produktet ikke brukes tidligere enn 1. april i høstkorn, vårkorn og høstraps.

### Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal før etter 7 dager etter behandling.

**Reg. Nr.: 2021.14**

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato i uåpna beholder.

**Tilvirker:** Corteva Agriscience

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København K, Danmark

### Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm, tlf. 03520

Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700

Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

AVGIFTSKLASSE: 2



3 362130 144656 >

NETTOINNHOLD: 1 L



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

#### Sammensetning:

Klopyralid (som dimetylammoniumsalt) 600 g/l

#### Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal før etter 7 dager etter behandling.

#### Bruksområde

Matrion™ 600 SL er tillatt bruk mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, vår- og høsthvete, vår- og høstbygg, formargkål, hodekål, mais (gjelder ikke sukkermais), forbete, sukkerbete, skogplanting på innmark, planteskoler, eng, beite og grasfrøeng. Kløver/belgvekster skades.

#### Virkemåte

Matrion 600 SL er et systemisk ugrasmiddel som opptas gjennom blad og blir transportert til vekstpunktene. Ugraset visner i løpet av 2-3 uker.

#### Virkeområde

Matrion 600 SL har meget god virkning mot ugras fra korgplantefamilien slik som burot, balderbrå, dyllearter (ett- og flerårige), flikbrønsle, gullkrage, haremata, løvetann, ryllik, tistler, åkergråurt, åkersvineblom m.fl. Matrion 600 SL har god virkning mot hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne og vikker. Matrion 600 SL kan dessuten brukes til å bekjempe kløver og andre belgvekster. Virkningen er som oftest utilfredsstillende mot andre ugrasarter.

#### Bruksanvisning

##### Generelt

Best virkning oppnås ved sprøyting på smått, saftspent ugras i god vekst. Åkertistel og åkerdylle bekjempes best på rosettstadiet (15-20 cm høye planter), men før de har dannet blomsterknopper. Maks. 1 behandling per sesong/kultur.

KULTUR	UGRAS	MAKS. DOSERING	TIDSPUNKT
Høstraps	Balderbrå, tistelarter, dyllearter, åkersvineblom og andre ugras fra korgplantefamilien	20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	BBCH 31-55 (kun tillat bruk om våren). Ikke tillat bruk før 1. april
Vårraps og -rybs Fôrraps Formargkål	Som over + gullkrage, vindel-slirekne m.fl.	20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	Når ugraset er i god vekst, og kulturen har utviklet 2-6 blad (BBCH 12-16)

KULTUR	UGRAS	MAKS. DOSERING	TIDSPUNKT
Hodekål	Som over + åkergråurt, svartsetvier m.fl.	20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	Når frøugraset er på 2-4-bladstadiet og rotugraset på rosettstadiet.
Mais (gjelder ikke sukkermais)		20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	Når hodekålen har 2-5 varige blad (BBCH 12-15).
Vår- og høsthvete, vår- og høstbygg		20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	Når maisplantene har 3-6 varige blad (BBCH 13-16)
Forbete, sukkerbete		20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	Når frøugraset er på 2-4-bladstadiet og rotugraset på rosettstadiet.
Skogplanting på innmark, planteskoler		20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	BBCH 21-32. Kun tillat bruk om våren. Ikke tillat bruk før 1. april i korn.
Ny og etablert eng, beite og grasfrøeng		20 ml/daa (10-30 liter vann pr. dekar)	Når betene har 2-5 varige blad (BBCH 12-15)

**Høyeste dose brukes mot stort ugras, flerårig ugras og innslag av gullkrage eller åkersvineblom.**

#### Klimaforhold

Det anbefales å sprøye tidlig på dagen når temperaturen er over 12°C og helst ved høy luftfuktighet. Det frarådes å sprøye når kulturplantene lider under tørkestress, ved ekstremt høye dagtemperaturer, eller når det er utsikt til nattfrost. Regn innen 4-6 timer etter sprøyting kan redusere virkningen.

#### Tillaging av sprøytevæske

Fyll sprøytenaken halvfull med vann og start røreverket. Tilsett tilmålt mengde Matrion 600 SL og etterfyll til ønsket vannmengde. Fortsett omrøringen under transport og sprøyting.

#### Tankblanding

Matrion 600 SL skal ikke tankblandes med andre kjemiske plantevernmidler. Matrion 600 SL skal heller ikke blandes med nitrogenholdig bladgjødsel da det kan gi skade på kulturen.

## **Etterfølgende kulturer og omsåing**

Matrigon 600 SL blir i begrenset omfang nedbrutt i plantemateriale, men etter innarbeiding i jord skjer det en rask mikrobiell nedbryting. For å unngå skade på etterfølgende, følsomme kulturvekster må rester av behandlet plantemateriale på åkeren kuttes opp, spres og pløytes ned om høsten.

Følsomme kulturvekster er ert, bønne, kløver og andre belgvekster, potet, gulrot og andre planter fra skjermplantefamilien, samt salat og andre fra korgplantefamilien. Dersom kulturen ødelegges og det blir behov for omsåing kan bare følgene kulturer sås: vårvete, vårbypgg, havre, mais eller raigras.

## **Bruksbegrensninger**

Bruk ikke planteavkapp fra planter behandlet med Matrigon 600 SL til kompost eller som dekkemateriale. Bruk ikke husdyrgjødsel fra husdyr føret på planter behandlet med Matrigon 600 SL som kompost/gjødsel i følsomme kulturer (se over).

## **Resistens**

Matrigon 600 SL tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxiner, HRAC gruppe O. Resistens mot Matrigon 600 SL er ikke kjent hos noen ugrasarter i Europa eller Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor anbefales det generelt å bruke ugrasmidler med ulike virkningsmekanismer i vekstskiftet. Spesielt i sammenheng med redusert jordarbeiding bør disse anbefalinger følges nøy. Vær oppmerksom på at manglende effekt (hvis middelet ellers er brukt korrekt under optimale forhold) kan skyldes begynnende resistensutvikling.

## **Forsiktighetsregler**

Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

## **Rengjøring av sprøyteutstyr**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tömmes i sprøyttanken. Rester fra sprøyttankens fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.

Skill sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

## **Affallshåndtering - Tomemballasje**

Grundig renjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plantevernmiddel og ikke renjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## **Lagring**

Lagres frostfritt i godt lukket originalemballasje.

<sup>TM</sup>Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

# Matrigon™ 600 SL

## UGRASMIDDEL

### Klopyralid vannløselig konsentrat

**Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, vår- og høstvete, vår- og høstbygg, formargkål, hodekål, mais (gjelder ikke sukkermais), fôrbete, sukkerbete, skogplanting på innmark, planteskoler, eng, beite og grasfrøeng. Kløver/belgvekster skades.**

### Sammensetning:

Klopyralid (som dimethylammoniumsalt) 600 g/l

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

Ikke rengjør spredeutstyr nært overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.

Spe 1For å beskytte grunnvannet må dette produktet ikke brukes tidligere enn 1. april i høstkorn, vårkorn og høstraps.

### Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal før etter 7 dager etter behandling.

### Reg. Nr.: 2021.14

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato i uåpna beholder.

**Tilvirker:** Corteva Agriscience

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København K, Danmark

### Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm, tlf. 03520

Norgesfør AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700

Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.



3 362130 144656 >

AVGIFTSKLASSE: 2

NETTOINNHOLD: 1 L