

BRUKSANVISNING (1)

Generelt:

MYCOTAL inneholder sporer av en spesiell stamme av den insektpatogene soppen *Verticillium lecanii* og er spesielt effektivt mot mellus og trips.

Virkemåte:

MYCOTAL vil under optimale forhold drepe mellus og trips etter 7-10 dager. Etter sprøyting vil sporene spire og danne hyfer som trenger inn i kroppen til insektene og ødelegger vevet. Soppen vil deretter vokse ut av insektet og danne nye sporer som kan spres videre og infisere nye mellus og trips.

Klima:

Vellykket bruk av MYCOTAL er avhengig av riktig luftfuktighet, temperatur og tidspunkt for behandling. MYCOTAL krever minimum: 80 % Relativ fuktighet og en temperatur på 18°C.

Bruksområder:

- MYCOTAL kan brukes til grønnsakkulturer som agurk, tomat og paprika, og prydplanter som krysanthemum, gerbera, roser, julestjerner, ildtopp og fuksia. I tillegg er MYCOTAL effektiv ved roting av stiklinger under plast. Feil bruk kan gi skade på enkelte kulturer.

Bruksanvisning:

- Posens innhold røres godt ut i vann. La løsningen stå i 2-4 timer før bruk så sporene kan ta opp vann. Bruk 3-4 l vann med en temperatur på 15-20°C til 500 g MYCOTAL. Blandingen må ikke utsettes for varme eller direkte sollys.
- Bruk rikelig med vann ved utsprøyting da dette fremmer spiring og vekst av soppen.
- Sprøyt helst sent på ettermiddagen for å få høyest mulig relativ fuktighet i kulturen. Sørg for å dekke bladundersiden og vekstpunktene godt under sprøytingen. Alle planter bør behandles.
- Sprøytevæsken skal være i omrøring under behandlingen.

Dosering:

- 1 gram pr. 1 vann (0,1 %)
- Til høye kulturer som tomat og agurk anbefales det å bruke 300 l ferdig blanding pr. 1000 m².
- Til lave kulturer anbefales det å bruke 150 l blanding pr. 1000 m².
- Til stiklinger anbefales det å bruke nok væske så stiklingene blir helt dekket.

Fortsetter på den andre siden

MYCOTAL

VANNOPPLØSELIG PULVER

MIKROBIOLOGISK INSEKTMIDDEL

Mot mellus og trips i veksthusgrønnsaker og prydplanter i veksthus

BRUKES KUN SOM INSEKTMIDDEL I HAGEBRUK

Sammensetning: *Verticillium lecanii* sporepulver ca. 16 % vol. vekt

ADVARSEL

Irriterer øynene

Unngå innånding av sprøytetåke

OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG

FOR BARN

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadelig tomemballasjen (se avfallshåndtering)



Avgiftsklasse 1

De er forbudt å bruke MYCOTAL i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Behandlingsfrist: 4 dager.

Produsent:

Koppert B.V., Nederland
P.O.Box 155
NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Importør:

L.O.G. S/L
Boks 141 Økern
0509 Oslo

MYCOTAL er registrert varemerke av Koppert B.V.

Holdbarhet: Se toppen av pakningen

REG.NR.: 98.28.99 **Nettoinnhold: 500 g**

BRUKSANVISNING (2)

Tidspunkt:

MYCOTAL skal brukes tidlig i kulturen mens antall insekter er lavt. For å få kontroll med melluspopulasjonen anbefales det å gjenta behandlingen 2-3 ganger med ca. 7 dagers intervall. MYCOTAL kan brukes alene eller sammen med *Encarsia formosa* (snylteveps mot mellus) for å kontrollere mellus. For å få god kontroll med trips, anbefales det å gjenta behandlingen med MYCOTAL 4-5 ganger med ca. 7 dagers intervall.

Integrert bruk med biologisk bekjempelse:

MYCOTAL kan brukes sammen med nytteinsekter til bruk i biologisk bekjempelse.

Integrert bekjempelse med kjemisk plantevern:

Selektiv bruk av kjemisk plantevern er mulig med MYCOTAL under følgende betingelser:

- Blandes aldri sammen med MYCOTAL i sprøyten.
- Soppmidler kan brukes inntil 3 dager før behandling eller mer enn 3 dager etter behandling med MYCOTAL.
- Bruk aldri kjemiske midler som inneholder de aktive stoffene: azinphos-methyl, foksim, kinometionat, mancozeb, penkonazol, prochloraz, svovel, tolyfluaniid, triforin.

Lagring:

Lagres lufttett i originalemballasje i kjøleskap ved 2-6°C. Bør ikke lagres sammen med spiselige produkter. Må ikke utsettes for frost.

Merk:

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Forsiktighetsregler:

Bruk egnede vernemasker, øyevern og egnet arbeidstøy ved tillaging av sprøytevæske og ved sprøyting. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Får man støffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. Ved uhell kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Rengjøring:

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettleddningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Avfallshåndtering:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrert plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.