

# KARATE® 2,5 WG

Lambda-cyhalotrin - vannløselig granulater

Mot skadedyr i korn, eng, gras- og kløverfrøeng, i oljevekster, potet, mais, ert, bønne, rotvekster, kål, og andre grønnsaksvekster på friland, i jordbær, bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, i planteskole og prydplanter på friland og i veksthus, i juletre- og pyntegrøntplantinger.

Sammensetning: Lambda-cyhalotrin  
Fyllstoffer

25 g/kg  
975 g/kg



HELSESKADELIG

## ADVARSEL

Farlig ved innånding og svelging  
Irriterer øynene

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

Ekstremt giftig for vannlevende organismer

- må ikke nyttes nærmere åpent vann enn 30 meter

Farlig for bier og andre pollinerende insekter

- må ikke brukes i den tiden av døgnet som pollinerende insekter flyr

Giftig for nyttedyr

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)



BEHANDLINGSFRIST: 14 DAGER

Avgiftsklasse 3

Nettoinnhold: 1 kg e

Tilvirker: **ZENECA** Agrochemicals, England

Produksjonsår: 1999  
Reg.Nr. 98.78.99

Importør: **ZENECA** Agro Scandinavia

Postboks 150 Bryn, N-0611 Oslo  
Tlf.: 0045 32 88 81 00

**Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

## **BRUKSOMRÅDE**

KARATE er tillatt brukt mot skadedyr i korn, eng, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais, ert, bønne, rotvekster, kål, og andre grønnsakvekster på friland, i jordbær, bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, i planteskole og prydplanter på friland og i veksthus, i juletre- og pyntegrøntplantinger.

## **BEHANDLINGSFRIST**

Matnyttige vekster må ikke behandles senere enn 14 dager før høsting.

## **VIRKEMÅTE**

KARATE har mage-, kontakt- og avskrek-kende virkning mot de fleste skadedyr. Det virksomme stoffet binder seg meget raskt til plantenes vokslag og er regnfast så snart sprøytevæsken er tørket inn. KARATE blir i ubetydelig grad påvirket av temperatur og luftfuktighet. Virketiden varierer fra 1 til 3 uker, avhengig bl.a. av kulturens veksthastighet, anvendt dosering, insektartens følsomhet, samt i hvilket omfang det skjer innflyging av nye skadedyr.

## **VIRKEOMRÅDE**

KARATE er et bredtvirkende pyretroid med meget god virkning mot insekter

med sugende og bitende munddeler, f.eks. bladlus, sikader, tegeter, trips, gallmygg, fluer, bladveps, jordfly, kålfly, nattfly, viklere, målere, møll, pyralider og andre sommerfugllarver; mot glansbiller, jordlopper og andre bladbiller og snutebiller. Både larver og fullt utviklede insekter bekjempes. KARATE har også virkning mot midd, særlig spinnmidd. Preparatet er skadelig for rovmidd og mange nytteinsekter.

## **BRUKSVEILEDNING**

**Preparatet må ikke brukes i blomstrende vekster i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl 0400 til kl 2300 dersom temperaturen overskrider 10°C, eller kl 0600 til kl 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C).**

## **Tillaging av**

### **spøytevæske/sprøyteteknikk:**

Fyll sprøytetanken halvfull med vann og tilsett KARATE under omrøring. Det er viktig at sprøytevæsken treffer skadedyrene eller avsettes jevnt på kulturveksten hvor dyra oppholder seg. Ved åkersprøyting anbefales 15-40 liter vann pr. dekar. I tette bestand og i kulturer med stort og velutviklet bladverk, f.eks. oljevekster, ert og korn, bør det brukes minst 25 liter vann pr. dekar for å sikre god dekning. Dyseforslag: 4110-16 ev. 4110-20 og trykk: 2-3 bar. I grønnsak-, bær- og prydvekster økes vannmengden, se anbefalinger.