

188\*53\*246



**SWITCH**

**SWITCH**<sup>®</sup>  
62.5WG

**SWITCH**

**SWITCH**<sup>®</sup>  
62.5WG

**Cyprodinil + fludioxonil granulat**  
Mot gråskimmel i jordbær på friland

Sammensetning:  
Fludioxonil.....250 g/kg  
Cyprodinil.....375 g/kg  
Fyllstoffer.....375 g/kg

X

IRRITERENDE

**ADVARSEL**  
Fare for allergi ved hudkontakt  
Unngå hudkontakt  
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn  
Ekstremt giftig for vannlevende organismer-  
Må ikke nyttes nærmere vannførende grøfter, bekker, samt dammer og større vannforekomster enn 10 m  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

BEHANDLINGSFRIST: 14 DAGER Avgiftsklasse: 3


Tilvirker: NOVARTIS CROP PROTECTION AG, Basel, Sveits  
Importør: NOVARTIS NORGE AS  
Postboks 237 Økern, 0510 OSLO

REG. NR. 99.15

Nettoinnhold: 1 kg


**NOVARTIS**

**Det er forbudt å bruke Switch<sup>®</sup> 62.5 WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon**




**BRUKSOMRÅDE**  
Switch er tillatt brukt i jordbær på friland.

**BEHANDLINGSFRIST**  
Det må ikke sprøytes senere enn 14 dager før høsting.



**VIRKEOMRÅDE**  
Switch virker forebyggende mot gråskimmel. Middelet består av to virksomme stoffer med forskjellige virkningsmekanismer som på forskjellig måte hemmer dannelse av enzymer som soppen trenger for å kunne angripe plantene. Den ene bestanddelen i Switch, cyprodinil, har kryssresistens med andre anilinopyrimidiner, slik som pyrimetanol. Man bør derfor veksle med preparater i andre middelgrupper. For å begrense risikoen for utvikling av resistente soppraser bør Switch ikke brukes mer enn to ganger i sesongen i et sprøyteprogram hvor kontaktmidler inngår. Switch har svært god effekt ved lav temperatur. Preparatet får noe redusert effekt ved temperaturer over 15°C.

**BRUKSRETTLEDNING**  
Jordbær: Bruk 50 g Switch 62.5 WG i 100 l vann pr. 1000 m enkeltråd. Sprøyt fra begynnende blomstring.



**FORSIKTIGHETSREGLER**  
Bruk vernehansker av polykloropren e.l. og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A/P2 S og L brukes. Vask hendene og ansiktet når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i et behandlet område, eller håndterer behandlete plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting.

**RENGJØRING AV SPRØYTEUTSTYRET**  
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

**AVFALLSHÅNDTERING**  
Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

**LAGRING**  
Må oppbevares frostfritt.  
©= Reg. varemerke for NOVARTIS CROP PROTECTION AG, Basel, Sveits

Spots without varnish & ink

L10128 NORW/12C

925 453

HERMETIC-CEBOX