

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51
Centium 36 CS - klomazon

Godkjent av Mattilsynet: 15.02.2022, 11.12.2023 og 02.10 2024 (rotpersille etter oppspiring)
Gyldig t.o.m. : Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til godkjenningsperioden for Centium 35 CS utløper.

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel

I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårds plasser og veier.

Virke – og bruksområde

Mot frøugras i rotpersille under dekke, knollselleri, hodekål og rosenkål på friland og under dekke (inntil to behandlinger), blomkål og brokkoli, pastinakk, dill, blad- og kruspersille på friland med og uten dekke, samt rødbete, fôrbete, bønner til konsum, fennikel og rabarbra på friland.

Behandlingsfrist:

Dill, blad- og kruspersille: 28 dager

Bruksrettledning

Dosering:

Maks 12,5 ml per dekar per år. Væskemengde 20-40 l/daa.

Det er generelt risiko for noe skade, spesielt på lette jordarter og i kombinasjon med store nedbørsmengder. Anbefalt å bruke maks 7,5 ml/daa på jord med mindre enn 10 % leire, 10-20 % leire 10 ml/daa og mer enn 20 % leire 12,5 ml/daa. Centium krever god jordfuktighet for best effekt.

Ta kontakt med lokal rådgiver for mer informasjon.

Bruksområde	Dose	Sprøytetid	Antall behandlinger	Merknader
Rotpersille under dekke	12,5 ml/daa	Sprøyt senest ved BBCH 07	1	
Rotpersille (etter oppspiring)	Maks 8 ml på en behandling, Maks 12,5 ml/daa totalt	Etter fremspiring, BBCH 11-14	1-2 behandlinger med 7 dagers mellomrom. Totaldose ikke over 12,5 ml/daa	Veldig forsiktig. Kontakt lokal rådgiver
Knollselleri på friland og under dekke	12,5 ml/daa Ved delt behandling er totaldosen maks 12,5 ml/daa	Påføres etter utplantning av kulturen frem til 8 blader (BBCH 00-18)	1-2	Ved delt behandling 1-2 uker mellom behandlingene
Hodekål og rosenkål på friland og under dekke	12,5 ml/daa Ved delt behandling er totaldosen maks 12,5 ml/daa	Påføres etter utplantning av kulturen frem til 8 blader (BBCH 00-18)	1-2	Ved delt behandling 1-3 uker mellom behandlingene
Blomkål og brokkoli på friland og under dekke	12,5 ml/daa	Påføres etter utplantning av kulturen frem til 8 blader (BBCH 00-18)	1	
Rødbete	5-12,5 ml/daa	Straks etter såing og minst tre dager før oppspiring (BBCH 00-07)	1-2 behandlinger, men totaldose ikke over 12,5 ml/daa	Redusert dose på lette jordarter, se info over.
Fôrbete	5-12,5 ml/daa	Straks etter såing og minst tre dager før oppspiring (BBCH 00-07)	1-2 behandlinger, men totaldose ikke over 12,5 ml/daa	Redusert dose på lette jordarter, se info over
Fôrbete	5-12,5 ml/daa Anbefalt 5-8 ml/daa etter fremspiring	Etter oppspiring BBCH 12-18	1-2 behandlinger, men totaldose ikke over 12,5 ml/daa	Må ikke brukes på betenes frøbladstadium. Alle betene må ha 2 til 8 velutviklede blad
Bønne til konsum	12,5 ml/daa	Før oppspiring BBCH 00-09	1	
Pastinakk friland inkludert under dekke	Inntil 7 ml. Maks dose 12,5 ml/daa totalt	Før oppspiring BBCH 00-07	1	Veldig forsiktig. Kontakt lokal rådgiver
Pastinakk	Maks 8 ml på en behandling, Maks 12,5 ml/daa totalt	Etter fremspiring, BBCH 11-14	1-2 behandlinger med 7 dagers mellomrom. Totaldose ikke over 12,5 ml/daa	Veldig forsiktig. Kontakt lokal rådgiver

Bruksområde	Dose	Sprøytetid	Antall behandlinger	Merknader
Fennikel	12,5 ml/daa	BBCH 0-18	1	
Dill, blad-og kruspersille friland inkludert dekke	12,5 ml/daa	Før oppspiring BBCH 00-09	1	
Rabarbra	12,5 ml/daa	Før oppspiring.	1	I planteåret, er behandling 7-10 dager etter planting

For bruk i rotpersille etter oppspiring gjelder følgende:

Bruksvilkår for å beskytte mennesker

Se forsiktighetsregler på ordinær godkjent etikett.

Produktet må ikke benyttes nærmere enn 2 m fra områder tilgjengelig for fastboende og forbipasserende.

Områder tilgjengelig for fastboende og forbipasserende er områder der personer kan oppholde seg som for eksempel veier, boliger, private hager og områder, institusjoner og offentlige arealer.